

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Revoxia®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Emulsión Concentrada (EC)

COMPOSICIÓN:

Pycoxystrobin..... 90 g/L
 Cyproconazol..... 40 g/L
 Aditivos..... 1 Litro
C.S.p.

90 g/L
 40 g/L
 1 Litro

Reg. PQUA N° SENASA

Titular del registro: DuPont Perú SAC
 Av. República de Panamá 3531, Of. 1203 - Lima 27
 Lima - Perú



Formulado por:
Iharabras S.A. Industrias Químicas
 Avenida Liberdade
 1701 - Sorocaba, São Paulo
 Brazil

Distribuido por:
Farmex S.A.
 Calle Dean Valdivia 148 Piso 7
 San Isidro, Lima 27 - PERU
 Teléfono: (01) 630-6400 Fax: (01) 630-6410
 www.farmex.com.pe



CONTENIDO NETO: 1 Litro

Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

© Marca Registrada de E.I. du Pont de Nemours and Company



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



RECOMENDACIONES DE USO Y MANEJO

Revoxia® es un fungicida sistémico y translaminar, actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol y la síntesis de ATP, lo que conlleva a la muerte del hongo por falta de energía para completar sus procesos vitales. **Revoxia®** debe ser aplicado dentro de un programa de protección de cultivos en rotación con otros fungicidas.

La preparación de la mezcla se realiza llenando el tanque hasta la mitad con agua, luego agréguese **Revoxia®** agitando continuamente. Añádase el resto de agua agitando.

Aplicase **Revoxia®** en forma de aspersión con la cantidad suficiente de agua para cubrir uniformemente el follaje de las plantas, según las dosis anotadas en el cuadro adjunto.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (ml/ha)	*P.C. (Días)	**LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Arroz	Añublo de la vaina	<i>Rhizoctonia solani</i>	800	45	0.01 (a)
	Añublo foliar	<i>Pyricularia oryzae</i>	1000		0.1 (b)
Maíz	Mancha de asfalto	<i>Phyllacora maydis</i>	800	42	0.04 (a) 0.01 (b)
Café	Roya	<i>Hemileia vastatrix</i>	800	40	0.05 (a) 0.07 (b)

*P.C.: Período de carencia en días.

**L.M.R.: Límite Máximo de residuos en ppm. (a) Pycoxystrobin, (b) Cyproconazol

FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN

Aplicar en etapa de desarrollo vegetativo, macollamiento y floración del cultivo, cuando se observen los primeros síntomas de la plaga. Máximo 2 aplicaciones /campaña/año.

PERÍODO DE REINGRESO

Ingresa al área tratada mínimo 12 horas después de la aplicación

COMPATIBILIDAD

En caso de duda realizar una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

