

0.50 cm

21.000 cm

0.50 cm

ZONA DE TROQUELADO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Antraneb®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Propineb 700 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto puede ser nocivo si se ingiere accidentalmente.
- El contacto prolongado o repetitivo con este producto puede causar reacciones alérgicas a ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar este producto en su envase original, bien tapado, etiquetado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Ditiocarbamato.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión accidental, mantener al paciente en reposo. Lavar la boca con agua, no inducir el vómito, ni dar de beber a un paciente inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, trasladar al paciente hacia el aire fresco y mantenerlo en reposo.
- No hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CISPROQUIM: 080-050-847, FARMEX S.A.: (01) 630-6400.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ANTRANEB® es un fungicida de contacto preventivo, se absorbe fácilmente a través de las hojas de la planta, impide el desarrollo del patógeno interfiriendo en el desarrollo del micelio y de la esporulación. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado. Aplicar con cualquier producto de aplicación terrestre.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/cil	kg/ha		
ARROZ	Quemado	<i>Pyricularia oryzae</i>	---	2,0	7	0,05
	Mancha carmelita	<i>Helminthosporium oryzae</i>	---	2,0	7	0,05
CEBOLLA	Mildiú	<i>Peronospora destructor</i>	0,75 - 1	---	7	0,05
ESPÁRRAGO	Mancha púrpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0,6 - 0,7	1,2 - 1,4	28	0,05
	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	0,75	---	15	0,3

P.C.: Período de carencia en días.

L.M.R.: Límite máximo de residuos en partes por millón.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

No realizar más de 2 aplicaciones por campaña. El intervalo de aplicación es mínimo 15 días.

PERÍODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 12 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este periodo.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción muy alcalina (pH > 9) y de los fertilizantes foliares. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD

ANTRANEB® no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Titular del Registro: FARMEX S.A.

Importado y distribuido por:



Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERU
Teléfono: (01) 630-6400
www.farmex.com.pe

Reg. PQUA N° 505 -SENASA

CONTENIDO NETO: 15 kg

Formulado por:
BIESTERFELD SHANGHAI CO. LTD.
906-907 Harbour Ring Plaza,
18 Xi Zang Road (M)
Shangai - 200001, China

Lote N° :
F. Form.:
F. Venc. :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

®Marca registrada de Farmex S.A.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



0.50 cm

4.50 cm

0.50 cm