

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Peligroso si es inhalado, causa irritación al tracto respiratorio, evite respirar la aspersión, usar equipo y protección respiratoria.
- Este producto puede ser nocivo si se ingiere accidentalmente.
- Ligeramente irritante a los ojos y a la piel.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar este producto en su envase original, cerrado etiquetado y alejado de alimentos para consumo humano o animal.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Neonicotinoides.
- **TELÉFONOS DE EMERGENCIA:** CISPROQUIM: 080-050-847, FARMEX S.A.: (01) 630-6400.
- En caso de intoxicación, por ingestión o por vía inhalatoria, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos, consultar con un oftalmólogo.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón durante 15 minutos.
- En caso de intoxicación por inhalación, trasladar al paciente al aire fresco, mantenerlo en reposo y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario.
- Antídoto: no hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo perforándolo o triturándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para abejas y arácnidos beneficios, no aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar, lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.



# Landprid<sup>®</sup>

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA  
INSECTICIDA AGRÍCOLA  
SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

**Composición:**

Imidacloprid ..... 350 g/L  
Aditivos..... c.s.p..... 1 L

**Reg. PQUA N° 664-SENASA**

Titular del Registro:

**FARMEX S.A.**

Dean Valdivia #148, Piso 7, San Isidro, Lima 27, Perú.  
Teléfono: (511) 630-6400

**Formulado y distribuido por:**



Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7  
San Isidro, Lima 27 - PERU  
Teléfono: (01) 630-6400  
www.farmex.com.pe

**CONTENIDO NETO: 20 L**

Loté N°:

F. Form:

F. Venc.:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

©Marca registrada de FARMEX S.A.



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**LANDPRID** es un insecticida sistémico con actividad translinar, de contacto y acción estomacal, fácilmente tomado por la planta desde la raíz y distribuido con movimiento acrópetalo.

**LANDPRID** bloquea los receptores postsinápticos afectando la transmisión de los estímulos del sistema nervioso de los insectos.

**LANDPRID** se aplica en pulverización empleando equipos terrestres tanto manuales como motorizados.

Agitar fuertemente el envase antes de usarlo. Llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (mL/cil)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Espárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	150 - 200	3	0,05
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	200	30	1

**L.M.R.:** Límite máximo de residuos. **P.C.:** Período de carencia en días.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

No realizar más de 2 aplicaciones por campaña, con una campaña al año. El intervalo de aplicación es de 14 días.

**PERIODO DE REINGRESO**

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con la mayoría de plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción muy alcalina (pH > 9). Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

**FITOTOXICIDAD**

**LANDPRID** no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

