

ZONA DE TROQUELADO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Miclobutan[®]

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Myclobutanil 400 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto puede ser mortal si se ingiere. Causa irritación moderada de los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar este producto en su envase original, bien tapado, etiquetado y alejado de alimentos para consumo humano o animal.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazoles
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, colocar al paciente en posición tranquila. No inducir al vómito, especialmente si el paciente está inconsciente.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado a un lugar con aire fresco y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario.
- En caso de contacto con la piel, quitarse las prendas contaminadas y lavar el área de la piel afectada con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, efectuar una limpieza con bastante agua, aplicada en los ojos en forma de chorro durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

NOTA AL MÉDICO

- Antídoto: No hay antídoto especificado. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CISPROQUIM: 080-050-847, FARMEX S.A.: (01) 630-6400.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestres. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar el uso del producto en suelos arenosos o en zonas con napas freáticas superficiales.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MICLOBUTAN[®] es un fungicida sistémico, rápidamente absorbido por el follaje y traslocado vía xilema. Posee acción preventiva, curativa y erradicante.

MICLOBUTAN[®] es un fungicida perteneciente al grupo de los triazoles, que actúa interfiriendo e inhibiendo la síntesis del ergosterol, componente fundamental de las paredes celulares de los hongos que controla.

Sistema de Preparación y Aplicación

MICLOBUTAN[®] se aplica en pulverización empleando equipos de aspersión manuales, a motor o montados sobre el tractor. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO			
ALCACHOFA	Odiosis	<i>Leveillula taurica</i>	100-150 g/cil	3	0.5
Capsicum annuum (pimientos, pprika, piquillo)	Odiosis	<i>Leveillula taurica</i>	100-150 g/cil	3	0.5
VID	Odiosis	<i>Uncinula necator</i>	200-300 g/ha	14	1

P.C.: Perodo de carencia en das. L.M.R.: Lmite mximo de residuos en partes por milln (ppm).

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIN

Realizar un mximo de dos aplicaciones por campaa, considerando una campaa al ao. El intervalo de aplicacin es de 15 das o ms.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar sin proteccin a un campo aplicado hasta 24 horas despus de la aplicacin. Mantener alejado al ganado durante ese periodo.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayora de los plaguicidas comnmente usados a excepcin de los de reaccin alcalina, azufres y cobres. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclndolos en su debida proporcin en un envase pequeo.

FITOTOXICIDAD

MICLOBUTAN[®] no ha mostrado sntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las caractersticas fsico qumicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para fines aqu recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Titular del Registro: **FARMEX S.A.**

Reg. PQUA N 291-SENASA

**CONTENIDO NETO:
25 kg**

Importado y distribuido por:



Calle Dean Valdivia N 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERU
Telfono: (01) 630-6400
www.farmex.com.pe

Formulado por:

JIANGSU FLAG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD

Changfenghe Road, Nanjing
Chemical Industrial Park, Luhe,
Nanjing, China 210047

Lote N:

F. Form.:

F. Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

Marca registrada de FARMEX S.A.

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

