

Etiqueta de 1 kg y 5 kg

Formuladores: FARMEX S.A., FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD. y AGROMOL BIOTECH CO., LTD.

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

FastKill®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN:

Fipronil	400 g/kg
Imidacloprid	400 g/kg
Aditivos	c.s.p.....1 kg

Reg. PQUA N° 2448-SENASA

Titular del Registro: FARMEX S.A.

Formulado por:
AGROMOL BIOTECH CO., LTD.
Dirección: East side, middle section of Binhe Road, Shanxian County
Chemical Industry Park, Xieji Town, Shanxian County, Heze City, Shandong
Province, China. Teléfono: +86-25-86304651

Importado y distribuido por:



Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERÚ
Teléfono: (01) 630-6400
www.farmex.com.pe

CONTENIDO NETO: 1 y 5 kg

N° de lote:
Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

© Marca registrada de Farmex S.A.



NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Causa ligera irritación a los ojos.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar el vapor o la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora, guantes, botas y máscara durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto bajo techo, lugar fresco seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con los alimentos, medicinas, bebidas ni forraje.
- Evite contacto con la piel y ropa.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Phenylpyrazoles y Neonicotinoids.
- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente los ojos con abundante agua por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y calzado contaminado y bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral.
- En caso de inhalación, retirar a la persona afectada del lugar de exposición. Si fuera necesario dar respiración artificial.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta.
- Antídoto: No existe antídoto específico, el tratamiento es sintomático.
- Teléfonos de Emergencia: SAMU: 106, FARMEX S.A.: (01) 630-6400, CISPROQUIM: 080-050-847.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración de cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivo aledaño.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. “Evitar la deriva por el viento”.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con el resto de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **FASTKILL®** es un insecticida de contacto e ingestión, con acción transaminar, sistémico con movimiento acropétalo y largo poder residual protegiendo los brotes de crecimiento de las plantas.
- **FASTKILL®** controla larvas de “mosca minadora” que realizan minas irregulares desde la base hacia el ápice de las hojas causando amarillamiento, áreas blancas y deformación, reduciendo su capacidad fotosintética afectando al llenado de las futuras espigas.
- Para aplicar de forma adecuada con **FASTKILL®**, llenar hasta la mitad el tanque de aplicación, luego adicionar el producto a la dosis recomendada y completar con agua; agitar y aplicar. Realizar una aplicación uniforme a las hojas.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar previa evaluación de la plaga, cuando se identifique la presencia de larvas en las minas al interior de las hojas de las plantas principalmente durante el desarrollo vegetativo.
- Aplicar dos veces por campaña, considerando 1 campaña/año.
- De requerir una nueva aplicación, rotar con otros productos de diferentes mecanismos de acción a fin de evitar la resistencia.
- No aplicar en época de floración.

PERÍODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 12 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

COMPATIBILIDAD

FASTKILL® es compatible con la mayoría de pesticidas de uso agrícola. Al realizar la mezcla, es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

FASTKILL® no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a la dosis y época de aplicación recomendada de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (p.p.m.)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/ha	%		
Arroz	Mosca minadora	Hydrellia wirthi	0.1	0.05	21	0.01

P.C.: Período de Carencia en días.

L.M.R.: Límite Máximo de residuos.

