

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- El producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Dicarboximide.
- No tiene antídoto específico, dar tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX : 0800-1-3040 CROP BUSINESS SAC : 349-2669

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanque o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS Kg /200 L	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Pimiento	“Moho gris”	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5	3	7.0

P.C.: Periodo de Carencia (días)

LMR: Limite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- **BOTRYKILL 500 WP** es un fungicida de contacto de amplio efecto residual, utilizado en el control de Botrytis en los cultivos indicados en el cuadro de usos.

- **BOTRYKILL 500 WP** es un fungicida que actúa inhibiendo la germinación de las esporas y bloqueando el desarrollo micelial.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Iniciar la aplicación de **BOTRYKILL 500 WP** de manera preventiva de acuerdo a las evaluaciones de campo y cuando las condiciones ambientales sean propicio para el desarrollo del hongo.

Realizar como máximo dos aplicaciones por campaña, con intervalo entre aplicaciones de 7 a 14 días. Dosis máxima por hectárea: 1.25 kg.

Se recomienda rotar con productos de diferente mecanismo de acción.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al campo tratada durante las primeras 12 horas después del tratamiento.

FITOTOXICIDAD

BOTRYKILL 500 WP no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

BOTRYKILL

500 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Iprodione 500 g/Kg
Aditivos c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N°

Titular del Registro: CROP BUSINESS SAC

Importado y Distribuido por:

CROP BUSINESS SAC



Av. Melgarejo N° 580 Dpto 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina
Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 500 grs

Fecha de Vencimiento:

Formulado por:

SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD

N° 23, Laine 5398, Shenzhuan Road

Songjiang District, Shanghai

CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

