

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- El producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Dicarboximide
- No tiene antidoto específico, el tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX : 0800-1-3040 CROP BUSINESS SAC : 349-2669

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y dépositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanque o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

- **BOTRYKILL 500 WP** es un fungicida de contacto de amplio efecto residual, utilizado en el control de Botrytis en los cultivos indicados en el cuadro de uso.

- **BOTRYKILL 500 WP** es un fungicida que actúa inhibiendo la germinación de las esporas y bloqueando el desarrollo micelial.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Iniciar la aplicación de **BOTRYKILL 500 WP** de manera preventiva de acuerdo a las evaluaciones de campo y cuando las condiciones ambientales sean propicio para el desarrollo del hongo. Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña, con intervalos entre aplicación de 7 a 14 días. Dosis máxima por hectárea: 1.25 Kg. Se recomienda rotar con productos de diferente mecanismo de acción.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al campo tratado durante las primeras 24 horas después del tratamiento.

FITOTOXICIDAD

BOTRYKILL 500 WP no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS kg/200 L	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Pimiento	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5	3	7.0

P.C.: Período de Carenancia (días) LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)



BOTRYKILL

500 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Iprodione _____ 500 g/kg
Aditivos _____ c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 2450 - SENASA

Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.

Importado y Distribuido por:

CROP BUSINESS S.A.C.



Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina - Lima
Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: 200 g.

Fecha de Vencimiento:

Formulado por:

SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD

N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road

Songjiang District, Shanghai

CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO