

8 cm

"LEA CUIDADAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL "PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y MANEJO:
- Botryxill 500 WP es un fungicida de contacto de acción preventiva. Se debe aplicar en el control de Botrytis en diversos cultivos.
- Botryxill 500 WP es un fungicida que actúa inhibiendo la germinación de las esporas y bloqueando al desarrollo micelial.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Iniciar la aplicación de Botryxill 500 WP de manera preventiva de acuerdo a las evaluaciones de campo y cuando las condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo de Botrytis.
Realizar como mínimo 2 aplicaciones por zanjalla, con intervalos entre aplicación de 7 a 14 días.

PERIODO DE RETENCIÓN
No regresar al campo trabajado durante las primeras 12 horas después del tratamiento.

EFFECTIVIDAD
Botryxill 500 WP no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las condiciones de uso y manejo del producto Botryxill 500 WP en las etiquetas y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

MANEJO PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:
- Evitar que lleguen organismos acuáticos.
- No cortar ni machucar o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo químico: Dithiocarbamato.
- En caso de intoxicación, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.
- No tiene antidoto específico, el tratamiento es sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA:
CROP BUSINESS S.A.C. 562088

OTROS: 3803-0401

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el producto, lavar los envases y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MANEJO PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:
- Evitar que lleguen organismos acuáticos.
- No cortar ni machucar o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS kg/200 L	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Cebolla	Moho gris	Botrytis cinerea	0.5	7	0.2
Pimiento	Moho gris	Botrytis cinerea	0.5	3	7.0

P.C.: Período de carencia (días) LMR: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

12 CM

8 cm

BOTRYXILL 500 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:
Iprodione 500 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA Nº 2430
Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.
Importador y Distribuidor:
CROP BUSINESS S.A.C.
Augusto B. Thompson

Av. Margarejo Nº 580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina - Lima
Teléfono: 349-2888

Formulado por:
SHANGHAI ETONG CHEMICAL CO., LTD
Nº 23, Lane 839, Shanzhuo Road
Songjiang District, Shanghai
CHINA

Fecha de Formulación:
Nº de Lote:
Contenido Neto: 200 gr.
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

12 CM