TALEO 1.5% SC

PLAGUICIDA BIOLóGICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIóN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIóN

Matrine ..... 15 g/L

Aditivos c.p.s.1L

Registro PBUA N°077 - SENASA - PBA - EV

Titular del Registro:
ALTEO AGROSCIENCES S.A.C.
Jr. Saenz Peña N° 344, Dpto. 105
Magdalena del Mar. Lima - Perú.
Telf.: 363-8659

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
REPRESENTACIONES Y PRODUCTOS PARA EL CAMPO RPC SAC
Calle Los Manzanos 649
Urbanización Country Club el Golf
San Isidro, Lima.
Telf.: 205-1111

FORMULADOR:
ALTEO S.A.S.
Parcelación Industrial Palmaseca Manzana J-1
Glorieta Aeropuerto Km 2 vía
Zona Franca Palmaseca.
Celular: (+57) 314 888 0793 / www.alteo.technology
Valle del Cauca – Colombia

CONTENIDO NETO:
No de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

TALEO 1.5% SC es un insecticida de origen vegetal de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión.
TALEO1.5% SC afecta el sistema nervioso central del insecto, provocando parálisis, impidiendo la entrada de oxigeno
provocando la muerte por asfixia. Además **TALEO 1.5% SC** suprime la ingestión del alimento, reduciendo la viabilidad larval
e impidiendo el crecimiento del insecto.

TALEO 1.5% SC se aplica disuelto en agua. Llenar un tercio del depósito a usar con agua, agregar la dosis respectiva del
producto, agitar y mezclar homogéneamente. Luego completar la capacidad del recipiente con agua.

TALEO 1.5% SC puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), equipos estacionarios o accionados
por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados. Se recomienda
Se recomienda acidificar el agua que se utilizará para la aplicación de **TALEO 1.5% SC** a un pH de 5.5 a 6.0.

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L / cil 200 L		
Arandano	Trips	*Thrips tabaci*	0.200	N.D.	N.D.

PC: Periodo de Carencia. **LMR:** Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION
Aplicar **TALEO 1.5% SC** al inicio de la infestación de la plaga. De ser necesario repetir una segunda aplicación de 7 a 14 días de realizada la primera aplicación de acuerdo a la presión de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO
12 horas

COMPATIBILIDAD
Compatible con la mayoría de plaguicidas con excepción de los de reacción alcalina

FITOTOXICIDAD
TALEO 1.5% SC no es fitotóxico usado a las dosis y los cultivos recomendados en la presente etiqueta.

PRECAUCIÓN

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DE SENASA

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "

Nombre comercial del producto: TALEO 1.5% SC
Nombre común: Matrine
Clase: Insecticida Agrícola
Reg - SENASA

Composición Química:
Matrine ..... 0.15 g/L
aditivos ..... c.s.p 1 L

Formula empírica y Formula estructural:

C15H24N2O



Presentación del producto:
Envases: Botellas de **250 ml, 1, 2, 4, 20, 200 L**

Propiedades Físicas y químicas del producto formulado
Apariencia: Liquido

Color: café oscuro

Olor: leve olor a hiervas

Densidad: 1.003 g/ml a 20ºC

pH (al 10%): 4.0 - 5.0

Persistencia a la espuma: 40 ml máximo después de 1 minuto

Viscosidad: 389 cps

Corrosividad: no corrosivo.

Inflamabilidad: no inflamable

Estabilidad en el almacenamiento: conserva sus propiedades biológicas, químicas y físicas como mínimo un año cuando es conservado en un lugar fino seco y bien ventilado, lejos de la luz solar directa.

LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
- Evitar el contacto con los ojos y contacto prolongado con la piel.

PRIMEROS AUXILIOS
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota al médico: tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
ESSALUD: 117
CICOTOX: 0-800-1-3040
TITULAR DE REGISTRO: 261-5227 / 3638659

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturandolo o perforandolo y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este proposito.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Evitar la deriva por el viento.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlare la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar hacia aguas subterráneas.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la presente etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas..

PRECAUCIÓN

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DE SENASA