

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
- Evitar el contacto con los ojos y contacto prolongado con la piel.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota al médico: tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

ESSALUD: 117
 CICOTOX: 0-800-1-3040
 TITULAR DEL REGISTRO: 261-5227 / 3638659

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturandolo o perforandolo y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este proposito.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No aplicar en presencia de abejas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Evitar la deriva por el viento.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recogido inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar filtración hacia aguas subterráneas.

TALEO 1.5% SC

Plaguicida Biológico de Uso Agrícola

INSECTICIDA AGRICOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Composición:

Matrine 15 g/L
 Aditivos c.s.p.1 L

Registro PBUA N° - SENASA

Titular de Registro: ALTEO AGROSCIENCIAS S.A.C.

Jr. Sáenz Peña N° 344 Dpto. 105, urb. Magdalena del Mar – Lima, Perú.
 Teléfonos:01-2615227 / 01 - 3638659

Formulado por: ALTEO BIOTECHNOLOGY & CROPSCIENCE

Autopista Bogota- Medellin Km 3.5 Centro Empresarial Metropolitano.
 Oficina B49. Teléfono: +57 321 811 30 65

Importado y distribuido por:

ALTEO AGROSCIENCIAS S.A.C.

Jr. Sáenz Peña N° 344 Dpto. 105, urb. Magdalena del Mar – Lima, Perú.
 Teléfonos:01-2615227 / 01 - 3638659

Contenido Neto: **2L.**

Lote N°.
 F. de Form.
 F. de Venc.

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TALEO 1.5% SC es un insecticida de origen vegetal de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión.

TALEO1.5% SC afecta el sistema nervioso central del insecto, provocando parálisis, impidiendo la entrada de oxígeno provocando la muerte por asfixia. Además **TALEO 1.5% SC** suprime la ingestión del alimento, reduciendo la viabilidad larval e impidiendo el crecimiento del insecto.

TALEO 1.5% SC se aplica disuelto en agua. Llenar un tercio del depósito a usar con agua, agregar la dosis respectiva del producto, agitar y mezclar homogéneamente. Luego completar la capacidad del recipiente con agua.

TALEO 1.5% SC puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados. Se recomienda Se recomienda acidificar el agua que se utilizará para la aplicación de **TALEO 1.5% SC** a un pH de 5.5 a 6.0.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L / Cil 200 L		
Arandano	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0.200	N.D.	N.D.

PC: Periodo de Carencia. N.D.: No determinado LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

Aplicar **TALEO 1.5% SC** al inicio de la infestación de la plaga. De ser necesario repetir una segunda aplicación de 7 a 14 días de realizada la primera aplicación de acuerdo a la presión de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO

12 horas

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de plaguicidas con excepción de los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

TALEO 1.5% SC no es fitotóxico usado a las dosis y los cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la presente etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas..



PRECAUCIÓN

