

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
- Evitar el contacto con los ojos y contacto prolongado con la piel.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico, inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrole la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota al médico: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
TITULAR DEL REGISTRO: 3638659
SAMU: 106

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
 - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
 - Evitar la deriva por el viento.
 - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlare la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar hacia aguas subterráneas.

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

TALEO 1.5% SC

PLAGUICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN

Matrince..... 15 g/L
Aditivos..... c.p.s.1L

Registro PBUA N°077 - SENASA - PBA - EV

Titular del Registro:
ALTEO AGROSCIENCES S.A.C.
Jr. Saenz Peña N° 344, Dpto. 105
Magdalena del Mar, Lima - Perú.
Telf.: 363-8659



IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
REPRESENTACIONES Y
PRODUCTOS PARA EL CAMPO
RPC SAC

Calle Los Manzanos 649
Urbanización Country Club el Golf
San Isidro, Lima.
Telf.: 205-1111



FORMULADOR:
ALTEO S.A.S.

Parcelación Industrial Palmaseca Manzana J-1
Glorieta Aeropuerto Km 2 vía
Zona Franca Palmaseca.
Celular: (+57) 314 888 0793 / www.alteo.technology
Valle del Cauca - Colombia

CONTENIDO NETO: **200 L**

No de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TALEO 1.5% SC es un insecticida de origen vegetal de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión.

TALEO 1.5% SC afecta el sistema nervioso central del insecto, provocando parálisis, impidiendo la entrada de oxígeno provocando la muerte por asfixia. Además **TALEO 1.5% SC** suprime la ingestión del alimento, reduciendo la viabilidad larval e impidiendo el crecimiento del insecto.

TALEO 1.5% SC se aplica disuelto en agua. Llenar un tercio del depósito a usar con agua, agregar la dosis respectiva del producto, agitar y mezclar homogéneamente. Luego completar la capacidad del recipiente con agua.

TALEO 1.5% SC puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados. Se recomienda acidificar el agua que se utilizará para la aplicación de **TALEO 1.5% SC** a un pH de 5.5 a 6.0.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/Cil 200L)	P.C	L.M.R
	Nombre Científico	Nombre Común			
Arándanos	Trips	Thrips tabaci	0.200	N.D.	N.D.

PC: Periodo de Carenacia.

LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **TALEO 1.5% SC** al inicio de la infestación de la plaga. De ser necesario repetir una segunda aplicación de 7 a 14 días de realizada la primera aplicación de acuerdo a la presión de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO

12 horas.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de plaguicidas con excepción de los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

"La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos."

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



PRECAUCIÓN

