

VerticalPlus® 250 WP

FUNGICIDA AGRICOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición Química:

Tebuconazole 250 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Registro PQUA N° 623 - SENASA

Titular de Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Calle Arica 242 Miraflores, Lima 18 - Perú.

Teléfono: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312

correo electrónico: sec@gruposilvestre.com.pe

Formulado por:

NOVA CROP PROTECTION CO. LTD.

8 South Liyuan Road, Jiangning Dis. Nanjing.
China.

Importado y

Distribuido por:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: 20 kg

F. de Form.:

N° Lote:

F. de Venc.:



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Causa irritación moderada a los ojos.
 - El producto puede ser irritante al aparato respiratorio.
 - Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, aspersión.
 - Evitar contacto con ojos, piel y ropa.
 - No almacenar dentro de la vivienda, ni cerca de alimentos, mascotas, ni forraje.
 - Ningún alimento que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos para consumo.
 - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
 - Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - Después de usar este producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
 - Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
 - Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
 - Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Triazol
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al médico, y mostrarle la etiqueta y hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, llamar al médico no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: tratamiento sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0-800-1-3040 ó 328 7398
ESSALUD: 0801-10200 ó 411 8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estancos o arroyos con los desechos y envases vacíos.

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en las zonas tratadas.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

VERTICAL PLUS® 250 WP, es un fungicida triazol, sistémico y de amplio espectro; con acción protectora, curativa. Es rápidamente absorbido por las partes vegetativas de la planta y distribuido dentro de la hoja.

VERTICAL PLUS® 250 WP, es utilizado en aplicaciones foliares, para el control de Oidium en vid.

VERTICAL PLUS® 250 WP, actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol, lo que ocasiona la muerte de las células de las membranas celulares del hongo.

VERTICAL PLUS® 250 WP, se emplea diluido en agua, en un volumen que permita una buena cobertura del producto. Preparar una pre-mezcla en un bote de plástico limpio e la dosis indicada. Luego, vaciar al recipiente definitivo completando la cantidad de agua.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones medioambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

Se recomienda 1 aplicación por campaña/ciclo.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

VERTICAL PLUS® 250 WP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No se ha observado síntomas de fitotoxicidad en el cultivo tratado.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/200 L	g/ha		
VID	"Oidium"	<i>Erysiphe necator</i>	200	600	14	2
	"Roya del arandano"	<i>Nachidiomyces vaccinii</i>	100-150	-	14	1.5
LMR: Límite Máximo Residuo						

PC: Período de Curación



ETIQUETA PROYECTO