

0.5 cm

21 cm

0.5 cm

0.5 cm

30 cm

Versión 01

0.5 cm

4.5 cm

ZONA DE TROQUELADO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Rice-Queen

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN:
Bensulfuron-methyl 600 g/kg
Aditivos c.s.p 1.0 kg

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Este producto es letal si es inhalado, no respire.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 72 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Sulfonylurea.
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua fresca, retirar los lentes de contacto y continuar con el lavado; no administrar ningún medicamento sin la consulta de un médico.
- En caso de contaminación dermal: remover la ropa contaminada, lavar la piel con abundante agua entre 15 – 20 minutos incluyendo debajo de las uñas.
- En caso de inhalación: llevar al paciente a un lugar aireado alejado de la zona tratada, tenerlo en reposo, si fuera necesario dar respiración artificial, trasladarlo a un centro médico si fuera necesario.
- Tratamiento médico: Aplique tratamiento sintomático.
- Antídoto: Sin antídoto específico.
- Teléfonos de Emergencia: CISPQUIM: 080-050-847, FARMEX S.A.: (01) 630-6400.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Ligeramente Peligroso para organismos acuáticos y semi-acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos de 10 metros.
- Ligeramente Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napa freática superficial o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

RICE-QUEEN es un herbicida de contacto selectivo al arroz y que se emplea en post-emergencia del cultivo y las malezas; capaz de control gramíneas y ciperáceas en emergencia post-temprana, sin dejar efectos residuales.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Llene el tanque con agua hasta un tercio del agua a utilizar, añada la dosis recomendada de RICE-QUEEN, agite hasta lograr una mezcla homogénea, finalmente complete con la cantidad de agua necesaria. Continúe agitando hasta antes de iniciar la aplicación. Aplicar con cualquier equipo de aspersión, tratando de lograr una cobertura uniforme.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (p.p.m.)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/ha	g/cil		
Arroz	Coquito	<i>Cyperus difformis</i>	0.1	-	80	0.02

P.C.: Período de carencias.

L.M.R.: Límite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda 2 aplicaciones por año. Aplicar después del trasplante (15 a 20 días) cuando el cultivo está en inicio de macollamiento.

PERÍODO DE REINGRESO

No entrar a las áreas tratadas durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

RICE-QUEEN es compatible con plaguicidas de uso común excepto con agentes oxidantes fuertes.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Titular del Registro: FARMEX S.A.

Importado y distribuido por:



Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERU
Teléfono: (01) 630-6400 Fax: (01) 630-6410
www.farmex.com.pe

Reg. PQUA N°

-SENASA

CONTENIDO NETO: 20 kg

Formulado por:
IPROCHEM CO.,LTD.
35F, Guomao Business Mansion, 3005
Nanhu Road, Luohu District,
Shenzhen China.
Teléfono: +8675582353001

Lote N°:

F. Form. :

F. Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

