CETAMISEN 250 SP

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE - SP

COMPOSICIÓN

Acetamiprid..... 250 g/Kg.
Aditivos..... c.s.p. 1 Kg.

Reg. PQUA N° 2456-SENASA

TITULAR DE REGISTRO: JEBSEN & JESSEN PERÚ S.A.C.
Av. de la Floresta 497, Oficina 201. Chacarilla del Estanque, San Borja, Lima 41. Lima – Perú
RUC: 20600385179

JEBSEN & JESSEN

FORMULADO POR:
NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO., LTD.
9th Floor, No.58, Nanhu Road, Nanjing 210017 - China.
Tel: 86 25 86518999 ext. 836
Fax: +86 25 86455985

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
JEBSEN & JESSEN PERÚ S.A.C.
Av. de la Floresta 497, Oficina 201. Chacarilla del Estanque, San Borja, Lima 41. Lima – Perú
RUC: 20600385179

essence

Fecha de formulación:
Nº de lote:
Contenido neto: 500 gr.
Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE **NO EXPLOSIVO** **NO CORROSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

LEA ESTA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Este producto es DAÑINO. No ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Neonicotionoide.

- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CICOTOX: 0800 13040
ESSALUD: 0801 10200

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CETAMISEN 250 SP es un insecticida que presenta una actividad translaminar y sistemica, actuando por contacto e ingestión.
CETAMISEN 250 SP actua como un analogo de acetilcolina, trasmisor quimico natural de los impulsos nerviosos, produciendo una excitacion nerviosa continua en el insecto que le provoca la muerte.
CETAMISEN 250 SP se emplea mezclando agua limpia con la dosis recomendada en el cuadro de uso. Aplicar pulverizaciones al follaje empleando cualquier equipo convencional terreste (mochila a palanca, atomizadora a motor, etc) que se encuentre debidamente calibrado.
Realizar aplicaciones foliares con cualquier equipo de aplicacion.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga. Toda aplicacion debe ser posterior a una evaluacion rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interaccion plaga-cultivo.
Se recomienda realizar maximo dos (2) aplicaciones por campaña considerando 1 campaña al año y antes de la aparicion de los primeros daños de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingresar a las áreas tratadas sin vestimenta de protección hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

CETAMISEN 250 SP es compatible con la mayoria de producto fitosanitarios de uso comun, a excepcion de aquellos de reaccion alcalina y agentes fuertemente oxidantes.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico usado a la dosis y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las caracteristicas fisico-quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (dias)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	(Kg/Cil)	(Kg/Ha)		
Pimiento	"Mosca blanca"	*Bemisia tabaci*	0.20	0.20	7	2
Papa	"Prodiplosis"	*Prodiplosis longifila*	0.08 - 0.12	0.48 - 0.64	7	0.01
Arroz	"Cigarrita del arroz"	*Tagosodes orizicolus*	0.12 - 0.15	0.08 - 0.1	12	0.01
Tomate	"Caracha"	*Prodiplosis longifila*	0.12 - 0.15	0.23 - 0.29	7	0.5

PC = Periodo de Carencia | LMR = Limite Maximo de Residuos