

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- GRUPO QUÍMICO: Pyrroles (Chlorfenapyr) + Avermectin (Emamectin benzoate)
- En caso de intoxicación, llame al medico inmediatamente o lleve al paciente al medico y muestrele la etiqueta.
 - En caso de ingestión, no inducir al vomito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
 - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX 0-800 -1- 3040

ESSALUD en linea (línea gratuita): 0801-10200- 411- 8000, opción 4

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas".
- "Peligroso para organismos acuáticos".
- "No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- "Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- "Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelo altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



GORRILLA® WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES - WG

Composición:

Emamectin Benzoate 20 g/Kg
Chlorfenapyr 200 g/Kg
Aditivos C.s.p.1Kg

Registro PQUA N° 2462 - SENASA

Titular de Registro: HANSEANDINA PERU S.R.L.

Dirección: Av. Javier Prado Este N° 1104, int. 602, San Isidro, Lima - Perú.

Telf.: +(511) 224-2462, 261-5227.

Formulado por: HANSEASIA LIMITED

Dirección: 3905 Two exchange Square, N°8, Connaught Place, Central Hong Kong.

Telf: +852-81974467

Importado por: HANSEANDINA PERU S.R.L.

Dirección: Av. Javier Prado Este N° 1104, int. 602, San Isidro, Lima - Perú.

Telf.: +(511) 224-2462, 261-5227.

Contenido Neto: **4 Kg.**

Lote N°.
F. de Form.
F. de Venc.

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

GORRILLA WG es un Insecticida de acción sistémica. Su capacidad de penetración le permite ser absorbido por el vegetal, pasando a la savia y distribuyéndose por todos los tejidos. Por esa causa, su eficacia es poco afectada por las lluvias.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS Kg/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Espárrago	"Gusano perforador grande de la bellota"	<i>Heliothis virescens</i>	0.08	14	0.01

P.C. Periodo de carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar GORRILLA WG una sola aplicación por campaña, considerando dos campañas por año.
Aplicar cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga. Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga - cultivo.
Se recomienda realizar 1 aplicaciones por campaña antes de la aparición de los síntomas de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO

No entrar al área tratada durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

GORRILLA WG es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común, a excepción de aquellos de reacción alcalina y agente fuertemente oxidantes.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico usado a la dosis y cultivo recomendable en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

