LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto es de cuidado no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
GRUPO QUIMICO: Pyrroles + Avermectin
- En caso de intoxicación, llame al medico inmediatamente o lleve al paciente al medico y muestrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vomito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los parpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU 106 - HANSEANDINA PERÚ S.R.L: +(511) 224-2462, 261-5227
CICOTOX 0-800-1-3040

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
-Después de usar el contenido, enjuague tres veces éste envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturandolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destido dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
-Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
-Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para abejas".
- "Peligroso para organismos acuáticos".
- "No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos".
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- "Peligroso para animales domesticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelo altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

GORRILLA® WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Gránulos Dispersables - WG

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Chlorfenapyr	200 g/Kg
Emamectin Benzoato	20 g/Kg
Aditivos	c.s.p. 1Kg

Registro PQUA No. 2462 SENASA

Titular de Registro: **HANSEANDINA PERU SRL**
Av. Javier Prado Este N° 1104 - Interior 602, San Isidro.
Lima - Perú. Tel: +(511) 224-2462, 261-5227

Formulado por: **HANSEASIA LIMITED**
3905 Two Exchange Square, 8 connaugt Place,
Central Hong Kong, China.
Tel: +(511) 224-2462, 261-5227
www.hanseasia.hk

Importado y Distribuido por: **HANSEANDINA PERU SRL**
Av. Javier Prado Este N° 1104 - Interior 602, San Isidro.
Lima - Perú. Tel: +(511) 224-2462

Contenido Neto: *20 Kg*
No. Lote:
Fecha Formulación:
Fecha Vencimiento:

NO INFLAMABLE
NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

GORRILLA® WG es un Insecticida de acción sistémica. Su capacidad de penetración le permite ser absorbido por el vegetal, pasando a la savia y distribuyéndose por todos los tejidos. Por esa causa, su eficacia es poco afectada por las lluvias.

"CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (Kg/Ha)	DOSIS (Kg/200 L)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO				
Espárrago	Gusano perforador de la bellota	*(Heliothis virescens)*		0.08	14	0.01
Maiz	Gusano Cogollero	*(Spodoptera frugiperda)*	0.3 - 0.4		28	0.02[1] 0.01[2]

P.C.: Periodo de Carencia
LMR: Límite Máximo de Residuos (1 Chlorfenapyr, 2 Emamectin benzoato).

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Aplicar cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga. Se recomienda aplicar GORRILLA® WG en campo abierto mediante pulverización foliar. Realizar máximo una (01) aplicación por campaña, considerando dos (02) campañas por año durante el crecimiento vegetativo. Considerar un gasto de agua promedio de 200 L/ha en maíz y 400-600 L/ha en espárrago y un pH de 5.5-6.5

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

GORRILLA® WG es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común, a excepción de aquellos de reacción alcalina y agente fuertemente oxidantes.

FITOTOXICIDAD

No es fitotoxico usado a la dosis y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las caracteristicas fisico quimicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aqui recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DE SENASA

Label x 20 Kg
400 x 350 mm