

31,2 ± 0,3

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BRIOSO es un fungicida sistémico y traslaminar con propiedades protectoras y curativas. Cuando se aplica por vía foliar, puede destruir selectivamente el micelio del hongo durante su periodo de incubación impidiendo que se originen lesiones o daños en el cultivo. El ingrediente activo Cymoxanil tiene acción sistémica en las plantas y Dimethomorph actúa impidiendo la formación de la pared celular de hongos comecitos como la rancha o hielo.

BRIOSO, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar. Se usa en pulverizaciones al follaje con mochila.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Enfermedad		Dosis kg/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Papa	Hielo (Rancha)	<i>Phytophthora infestans</i>	1.2	14	0.05 ¹ 0.05 ²

PC: Periodo de Carenia **LMR:** Límite Máximo de Residuos
¹Dimethomorph ²Cymoxanil

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

- Se recomienda aplicar **BRIOSO** con una aplicación por campaña como máximo, considerando dos campañas al año.
- Aplicar cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones favorezcan la aparición de la enfermedad (Alta humedad relativa).
- Rotar con otros fungicidas de diferente modo de acción con el fin de evitar resistencia.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: **BRIOSO** es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional, excepto con aquellos de naturaleza muy ácida.

FITOTOXICIDAD: El producto no causa fitotoxicidad si es usado en el cultivo recomendado y dosis señaladas en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

BRIOSO

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Dimethomorph.....

300 g/kg

Cymoxanil.....

50 g/kg

Aditivos.....

c.s.p.t kg

Reg. PQUA Nº SENASA

Titular del Registro: BRITAGRO S.A.C.

Titular de Registro,

Importador y Distribuidor:

BRITAGRO S.A.C.

AV. SANTA ROSA 100 BARRANCO,

I.B.A. - DPMI

TELÉFONO +511 96327800

Formulador:

RSC INC | 南京艾森精细化工有限公司

Nanjing Essence Fine-Chemical Co., Ltd.

Add: 41 Sheng Baifeng S. N° 170 Taibao Road Nanjing, China

Post Code: 211800 / Telefon: +86 25 84425985

LOTE Nº :



FECHA DE FAB :

FECHA DE VOTO:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"		Propiedades Físicas y químicas del producto formulado	
Nombre comercial del producto: BRIOSO Nombre común: Cymoxanil + Dimethomorph Clase: Fungicida Agrícola Reg PQUA N° - SENASA		Apariencia: Polvo	
Composición Química: Dimethomorph 300 g/kg Cymoxanil 50 g/kg Aditivos c.s.p. 1 kg		Color: Blanquesino	
Formula empírica: Dimethomorph: C₂₁H₂₂ClNO₄ Cymoxanil: C₇H₁₀NaO₃ Peso Molecular: 387.9 Dimethomorph: 198.2 Formula estructural: Dimethomorph:		Olor: Olor característico	
		Densidad: 0.60 g/ml (20°C)	
Cymoxanil: 		pH: 5.6	
Presentación del producto: Envases de 100 gr, 250 gr, 500 gr, 1 kg, 5 kg, 25 kg		Humedad: Max. 0.9% Humectabilidad: Max. 30 s	
		Persistencia a la espuma: Max. 25 ml después de 1 minuto.	
		Corrosividad: no corrosivo.	
		Estabilidad en el almacenamiento: conserva sus propiedades biológicas, químicas y físicas como mínimo dos años cuando es conservado en un lugar, frío, seco y bien ventilado, lejos de la luz solar directa.	
		NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO	
		PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN - Este producto es de cuidado, no ingerir. - Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo o aspersión. - Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado. - Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes. - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de aplicación. - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón. - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.	
		PRIMEROS AUXILIOS - Grupo Químico: Cyanoacetamide oxime (Cymoxanil) + Morpholine (Dimethomorph). - En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta. - En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones. - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera. - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y tapado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón. - En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario. Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.	
		TELÉFONOS DE EMERGENCIA CICOTOX: (01) 328-7700 CISPROQUIM: 0800-50947 ESSALUD: 411-8000, apéndice 4	
		MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS Después de usar el contenido de este envase inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.	
		MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE - No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos. - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 05 metros. - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlarla deriva. - No aplicar en zonas con napa freática superficiales o en suelos altamente permeables. - En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.	