LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado no ingerir. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas forraje y/o semillas.
- Después de usar este producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión).
- Usar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

GRUPO QUIMICO: Neonicotinoide y avermectin

- En caso de inhalación, colocar a la victima en una zona de aire fresco. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 20 minutos.
- En case de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse en abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no inducir al vomito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsión llame al médico inmediatamente. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota al médico: tratamiento sintomático y de sostén.

TELEFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX 0-800 - 1- 3040
ESSALUD: 0801-10200

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas, debe usarse para conservar alimentos o agua para beber.
- Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello, no botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Toxico para las abejas y atrópodos benéficos
- No aplicar en época de floración del cultivo
- No aplicar en presencia de polinizadores
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- "Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes" "Evitar la deriva por el viento"
- "Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas".
- "Peligroso para organismos acuáticos".
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos".
- "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto".
- "Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros".
- "Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre". "No permitir animales en el área tratada.
- "El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva".

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BELLAGIO SG es un insecticida que tiene una actividad por ingestión y por contacto, con actividad translaminar y sistémica.

BELLAGIO SG se emplea mezclando con agua limpia la dosis recomendada en el cuadro de uso. Aplicar pulverizaciones al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochila a palanca, atomizadora a motor, etc) que se encuentre debidamente calibrado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga. Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga - cultivo.
Se recomienda realizar 1 aplicaciones por campaña/año antes de la aparición de los síntomas de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

BELLAGIO SG es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común, a excepción de aquellos de reacción alcalina y agente fuertemente oxidantes.

FITOTOXICIDAD

No es fitotoxico usado a la dosis y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las caracteristicas fisico quimicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aqui recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Por Ha (Kg)		
Maiz	"Cogollero"	*Spodoptera frugiperda*	0.10 a 0.15	10	0.01 0.01
Pimiento	"Mosca blanca"	*Bemisia tabaci*	0.10 a 0.15	7	0.3 0.02

PC: Periodo de Carencia. **LMR:** Límite Máximo de Residuos.

BELLAGIO® SG

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

GRANULOS SOLUBLE - SG

Composición Química:

Acetamiprid	240 g/Kg
Emamectin Benzoate	50 g/Kg
Aditivos	c.s.p 1 Kg

Reg. PQUA Nº - SENASA

Titular de Registro: **HANSEANDINA PERU SRL**
Av. Javier Padro Este 1104 - Interior 602
Telefono: 611-8282

Formulado por: **HANSEASIA LIMITED**
3905 Two Exchange Square. 8 Connaught Place, Central, Hong Kong.
Tel: + 852 8197 4467

Importado y Distribuido por: **HANSEANDINA PERU SRL**
Av. Javier Padro Este 1104 - Interior 602
Telefono: 611-8282

Contenido Neto: **500 gr.**
Lote N°.
F. de Form.
F. de Venc.

NO INFLAMABLE **NO EXPLOSIVO** **NO CORROSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO