"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

BELLAGIO®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

GRÁNULOS SOLUBLES (SG)

COMPOSICIÓN

Acetamiprid.....240 g/Kg
Emamectin benzoate.....50 g/Kg
Aditivos.....c.s.p. 1Kg

Reg. PQUA Nº 2467 - SENASA

Titular de Registro: HANSEANDINA PERU SRL
Av. Javier Prado Este N° 1104. Int. 602.
Telefono: 611-8282

Formulador: HANSEASIA LIMITED
3905 Two Exchange Square. 8 Connaught
Place, Central, Hong Kong.
Tel: + 852 8197 4467

Importador y Distribuidor: HANSEASIA LIMITED
Av. Javier Prado Este N° 1104. Int. 602.
San Isidro, Lima - Perú
Telf: +(511) 224 -2462

Fecha de Formulación: Ver Información en el Envase
Lote No.: Ver Información en el Envase
Contenido Neto: **500 gr**
Fecha de Vencimiento: Ver Información en el Envase

Escanéame

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA

"MUY TÓXICO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS"

PELIGRO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, forraje y/o semillas.
- Después de usar este producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión).
- Usar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al area tratada en las primeras 24 horas despues de la aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS:
Grupo Químico:Neonicotinoide y Avermectin
- En caso de inhalación, colocar al victima en una zona de aire fresco. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no inducir al vomito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones. Llame al medico inmediatamente. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota al médico: Tratamiento sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU 106
HANSEANDINA PERÚ S.R.L.: +(511) 224-2462. 261-5227

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe usarse para conservar alimentos o agua para beber.
- Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello, no botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
- Toxico para las abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- "Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes". "Evitar la deriva por el viento".
- "Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas".
- "Peligroso para organismos acuáticos".
- "No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos".
- "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto"
- "Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros".
- "Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre".
- "No permitir animales en el área tratada".
- "El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlarla deriva".

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
BELLAGIO SG es un insecticida que tiene una actividad por ingestión y por contacto, con actividad translaminar y sistémica.

BELLAGIO SG se emplea mezclando con agua limpia la dosis recomendada en el cuadro de uso. Aplicar pulverizaciones al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochila a palanca, atomizadora a motor, etc.) que se encuentre debidamente calibrado.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:
Aplicar cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga. Toda aplicación deber ser posterios a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga - cultivo. Se recomienda realizar 1 aplicación por campaña/año antes de la aparición de los sintomas de la plaga.
Vid: Se recomienda realizar un máximo de 1 aplicación por campaña, considerando 1 campaña al año. No aplicar en época de floración.
PERIODO DE REINGRESO
No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas despues de la aplicación.
COMPATIBILIDAD
BELLAGIO SG es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común, a excepción de aquellos de reacción alcalina y agentes fuertemente oxidantes.
FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico usado a las dosis y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	Kg/Ha	Kg/200L		
MAIZ	"Cogollero"	*Spodoptera frugiperda*	0.10 - 0.15	--	10	[1]0.01 [2]0.01
PIMIENTO	"Mosca blanca"	*Bemisia tabaci*	0.15	--	7	[1]0.3 [2]0.02
VID	"Thrips"	*Thrips tabaci*	*0.425	0.1	14	[1]0.5 [2]0.03
ARROZ	"Gusano Gogollero"	*Spodoptera frugiperda*	--	0.25	12	[1]0.01 [2]0.005

PC: Periodo de carencia (días)
* Gasto de agua máximo 850 L/Ha

LMR: Limite Maximo de Residuos (ppm)
[1] Acetamiprid
[2] Emamectin benzoate

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

BELLAGIO®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

GRÁNULOS SOLUBLES (SG)

COMPOSICIÓN

Acetamiprid.....240 g/Kg
Emamectin benzoate.....50 g/Kg
Aditivos.....c.s.p. 1Kg

Reg. PQUA Nº 2467 - SENASA

Titular de Registro: HANSEANDINA PERU SRL
Av. Javier Prado Este N° 1104. Int. 602.
Telefono: 611-8282

Formulador: HANSEASIA LIMITED
3905 Two Exchange Square. 8 Connaught
Place, Central, Hong Kong.
Tel: + 852 8197 4467

Importador y Distribuidor: HANSEASIA LIMITED
Av. Javier Prado Este N° 1104. Int. 602.
San Isidro, Lima - Perú
Telf: +(511) 224 -2462

Fecha de Formulación: Ver Información en el Envase
Lote No.: Ver Información en el Envase
Contenido Neto: 500 gr
Fecha de Vencimiento: Ver Información en el Envase

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA

"MUY TÓXICO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS"

PELIGRO