

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Este producto es dañino, no ingerir.
Causa irritación moderada a los ojos.
No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
Después de usar el producto bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

Almacenaar el producto bajo techo en un lugar seco y bien ventilado, lejos de la casa-habitación.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni objetos.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para el consumo.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Inorgánico Cupríco

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.

Si se produce el contacto con los ojos lave con abundante agua por lo menos 15 minutos, también bajo los párpados y acudir inmediatamente al médico.

En caso de contaminación de la piel, retirar toda la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón, retirar al afectado de la zona tratada.

En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarlo a un ambiente ventilado, brindar respiración artificial si fuera necesario.

En caso de ingestión, acudir inmediatamente al médico portando la etiqueta.

ANTIDOTO: Este producto no tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

En caso de emergencia llamar a los siguiente teléfonos:

SAMU: 106

CHEMICAL PROCESSES INDUSTRIES S.A.C (01) 5360448

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESCHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego multilavado triturando o perforándolo.

Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.

Devuélvase al envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para organismos acuáticos.

El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

No contaminar, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5m.

No contaminar fuentes de agua con los restos de aplicación o sobantes del producto.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y aves silvestres. No permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Sulfato de Cobre Pentahidratado.....

Aditivos c.s.p.....

200 g/l
c.s.p. 1

Reg. P.AQUA N° 2477 -SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: CHEMICAL PROCESSES INDUSTRIES S.A.C.®

Formulado y
Distribuido por:



Chemical
Processes Industries S.A.C.®

Calle "P" N° 141 - Urb. Pro Bno Sector Z.I. - S.M.P. - Lima
Central Telefónica: (511) 536-0448
E-mail: ventas@cpisac.com
www.cpisac.com

Fecha de formulación

: 0

Lote N°

: 0

Contenido neto

: 1 Litro

Fecha de vencimiento

: 0

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Sulpenta -27® es un fungicida sistémico de acción preventiva y curativa. Actúa contra la desnaturalización de las proteínas y destrucción de las paredes celulares de los hongos.
Aplicar por sistema de riego tecnificado o por aspersión a cielo de pluma.
Sulpenta -27® se emplea diluido en agua. Preparar una pre mezcla con la dosis recomendada en un tercio de volumen a utilizar, agitar bien y completar el volumen de agua hasta lograr una mezcla homogénea.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO	Uso/Litro 200 L.	Dosis Litros		
Palo	Podredumbre radicular	Phytophthora cinnamomi	0.40	1.7	7	20
	Roya	Neovossia vaccinii	0.40		N.A	5
Arándano	Moho gris	Botrytis cinerea	0.20 - 0.25		N.A	5

L.M.R: Límite máximo de residuos (ppm) PC: Período de Carencia N.A: No aplica
T.M.A máxima: registro: 340 g/l a./ha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar cuando las condiciones sean las apropiadas para el desarrollo de la enfermedad.
Se deberá evaluar la incidencia del patógeno.

-Realizar máximo una aplicación por campaña al año (Palo).

-Arándano: Dosis máxima de aplicación 1.6 L/ha (Roya).

-Arándano: Dosis máxima de aplicación 0.5 - 0.6 L/ha (Moho gris), considerando un gasto de agua de 500 L/ha.

PERIODO DE RENEGRESO:

No entre al área tratada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de plaguicidas, excepto con agentes oxidantes, bases fuertes y ácidos. Se recomienda realizar las primeras 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxica a la dosis y uso recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO

