

**"LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR
EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las 24 horas (usar máscara y guantes protectores).
- Usar en su envase original y almacenarlo herméticamente cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Mancozeb, Alquilendis (ditiocarbamatos)
- Benomyl: Benzimidazoles
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fuese con la piel, lávela con abundante agua y jabón.
- Si se ha ingerido el producto, provocar el vómito hasta que arojee el veneno. Se recomienda tratamiento sintomático.
- En caso de emergencia llamar a CICOTOX: 0800-1-3040 (Gratuito), ESSALUD: 117.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para peces.

METAMAS

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición:

Benomyl..... 150 g/kg
Mancozeb..... 640 g/kg
Aditivos..... c.s.p. 1Kg

Reg. Nº 517-97-AG-SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.

Calle Sucre Nº 270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:



Alimentante Pastene 300,
Providencia, Santiago - Chile
Teléfono: (56-2) 24689100
Fax: (56-2) 24689100

Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270, Ate. Lima Perú
Tel.: 717-6040 / 717-6041
R.U.C. 20101637221
RU Nº 14.1097

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

METAMAS, es un fungicida compuesto por un ditiocarbamato y un benzimidazol que combina la acción de contacto y la sistémica. METAMAS es un fungicida de amplio espectro de acción. Su alta tecnología de fabricación y formulación lo destaca de otros fungicidas, haciéndolo más estable, más eficaz y de uso seguro. Puede ser aplicado en la desinfección de semillas para el control de la chupadera fungosa. METAMAS es absorbido por las hojas y raíces, principalmente por translocación acropétala y con acción protectora sobre el follaje.

SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

METAMAS, no ofrece inconvenientes en la preparación de la mezcla, pero para formar una mejor suspensión conviene diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, luego remover la mezcla y finalmente completar el volumen de aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS		PC LMR
	Nombre Común	Nombre Científico	kg/200L	g/m ²	
Tiempo	Roya del tipo	Puccinia graminis	0.6 - 0.8	3 - 4	26 0.5
Zanahoria	Oidium	Erysiphe graminis f.sp. tritici	0.8 - 1	4 - 5	5 2
Maíz	Oidium	Erysiphe cichoracearum	0.8 - 1	4 - 5	14 0.1
Apio	Mancha de la hoja	Carpospora apii	0.8 - 1	4 - 5	5 2
Septoriosis del apio	Septoria apicola		0.8 - 1	4 - 5	5 2
Manejo	Oídiosis	Oidium mangroveae	0.8 - 1	4 - 5	5 2
Papa	Chupadera fungosa	Rhizoctonia solani	1	5	-
	Remojar la semilla por 5 minutos y luego mezclar uniformemente				
Algodón	Chupadera fungosa	Rhizoctonia solani	0.25-0.30kg semilla	1.25 - 1.3	-
	Mezclar la semilla uniformemente				
Café	Roya del café	Hemileia vastatrix	0.8 - 1	4 - 5	5 3
Manizaba	Manchas foliares	Carpospora coffeicola	0.8 - 1	4 - 5	5 0.1
Habla	Podredumbre de raíces y tallos	Botrytis cinerea	0.8 - 1	4 - 5	5 0.1
Cebolla	Podredumbre	Sclerotium cepivorum	1	5	5 0.1
Aroz	Chupadera fungosa	Rhizoctonia solani	0.75	-	25 0.001

PC= Período de curación en días
LMR= Límite máximo de residuos en ppm

(1) Mancozeb, (2) Benomyl.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Puede ser aplicado en forma preventiva o cuando los primeros síntomas hayan sido detectados. Repetir las aplicaciones cada 7 o 14 días, dependiendo de las condiciones climáticas o de la presión de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas para reingresar al campo tratado sin equipo de protección personal.

COMPATIBILIDAD: METAMAS, es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común. No es compatible con productos alcalinos. En caso de aceites y concentrados emulsionables, verificar previamente la compatibilidad física.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las indicadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

v20190612



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

