

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado (evite respirar la aspersión).
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico:** Sulfonilurea y Triazine.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación: llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión: no inducir al vómito sin supervisión médica. No administre nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación: retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Teléfonos de emergencia: **CICOTOX: 0800-1-3040. ESSALUD: 0801-1-0200. HORTUS S.A.: 717-9040.**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Realizar Obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques, arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas de napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia agua subterráneas.

ZEAMAX ULTRA®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

ACEITE DISPERSABLE - OD

Composición:

Nicosulfuron..... 40 g/L
Atrazina.....200 g/L
Aditivosc.s.p. 1L

Reg. PQUA N° XXXX - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.

Calle Sucre N° 270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:



IPROCHEM CO., LTD.

35Floor, Guomao Business Mansion,
No.3005, Nanhu Road, Luohu District,
Shenzhen, China
Teléfono: +86-755-25195287

Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú.

Telf: 717-9040 / 717-9041

R.U.C. 20101637221

RU N° 141097

Contenido Neto: 1 L

Lote N° :

Fecha de formulación :

Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ZEAMAX ULTRA es un herbicida cuyos ingredientes activos (Nicosulfuron + Atrazina) proporciona una protección amplia contra las malezas.

Herbicida sistémico selectivo, absorbido por el follaje y las raíces, con rápida translocación en el xilema y el floema a los tejidos meristemáticos.

Se debe realizar la aplicación cuando el suelo está en capacidad de campo y las malezas estén turgentes.

Evite aplicar en plantaciones de maíz estresadas o cuando haya agua libre sobre la superficie de las hojas de las malezas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	P L A G A		DOSIS (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
MAÍZ	Lengua de gato	<i>Portulaca oleracea</i>	0.75 - 1	45 ⁽¹⁾	0.01 ⁽¹⁾
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>		21 ⁽²⁾	0.2 ⁽²⁾
	Pega pega	<i>Setaria verticillata</i>			

PC: Periodo de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuo en ppm.
(1) Nicosulfuron (2) Atrazina

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar solo una vez por campaña. El producto se emplea cuando la maleza tiene 2 y 4 hojas; cuanto más temprano se aplique, mejores resultados se obtienen.

EFFECTOS SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS: No se ha reportado efecto alguno en cultivos sucesivos.

PERIODO DE REINGRESO: Se puede reingresar al campo tratado sin equipo de protección personal (EPP), después de 24 horas de realizado el tratamiento.

COMPATIBILIDAD: Compatible con la mayoría de pesticida.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

