

SIZE: 14.5 x 21.0 cm

“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión y el contacto con la piel y ropa.
- Causa daño temporal a los ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas después de la aplicación.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Strobilurin y Antibiótico nucleósido
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
 - En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
 - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado y bañarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos, incluso bajo los párpados.
 - En caso de inhalación lleva al paciente a un lugar ventilado. Aplicar respiración artificial si fuera necesario.
 - Antídoto: No existe. Dar tratamiento sintomático.
 - En caso de emergencia llamar a:

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106
GOMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO: 01 2663828

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

UBUNTU-AG® DUO es un fungicida de acción sistémica y de contacto. Está formulado con dos ingredientes activos; Pyraclostrobin y Ningnamycin, el primero actúa inhibiendo la respiración mitocondrial y el segundo inhibe la demetilación del esteroles, de esta manera detienen el crecimiento del hongo lo que conlleva a su muerte.

UBUNTU-AG® DUO, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitar hasta obtener una mezcla homogénea.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Enfermedad		Dosis	PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	Kg/200L		
Espárrago <i>Asparagus officinalis</i>	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.2 - 0.3	40	0.02* 0.01**
Vid <i>Vitis vinifera</i>	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.2 - 0.4	10	0.3* 0.5**

PC: Periodo de carencia en días

*Pyraclostrobin

LMR: Límite máximo de residuos en ppm

**Ningnamycin

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad, o cuando se presenten condiciones ambientales que favorezcan su desarrollo.
- Como máximo una vez por campaña / año.
- En caso se requiera una nueva aplicación, rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción a fin de evitar la resistencia.
- Máximo aplicar 1 Kg / Ha.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

No se ha reportado incompatibilidad con otros plaguicidas. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previamente.

FITOTOXICIDAD

UBUNTU-AG® DUO no es fitotóxico en el cultivo recomendado cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso listadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.”

