

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No re-ensasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Triazole

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fue por la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental del producto, no provoque el vómito a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de inhalación colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- No existe antídoto específico.
- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:

CICOTOX: 328-7398 , ESSALUD: 117
(GRATUITO) , CISPROMQUIM: 0-800-5-0847
Grupo Kampu: 2578160

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, finalmente destrúyalo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

K-ZOL

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición

Paclobutrazol.....250g/L
Aditivos.....c.s. p 1.0 L

Reg. RCP N° SENASA

Titular del registro: GRUPO KAMPU PERÚ SAC

Formulado por:

Nanjing Essence Fine Chemical Co., Ltd.
9th Floor, N° 58 Nanhu Road 210017 – Nanjing
Jiangsu-República Popular China.
Teléfono: 86-25-86518999 ext. 838
Fax: 86-25-86455985

Importado y distribuido por:

GRUPO KAMPU PERÚ SAC

Av. Manuel Olguín N° 335 Of. 904 urb. Monterrico
Chico-
Santiago de Surco-Lima- Perú
RUC: 20553374112
Teléfono: 2578160



División agrícola

Contenido Neto: 200 L

Lote N°

F. de Form.

F. de Venc.

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

K-ZOL es un regulador de crecimiento del grupo de los triazoles, que inhibe la síntesis de giberelinas (hormona responsable del crecimiento vegetativo) disminuye el crecimiento vegetativo y propicia el desarrollo de yemas florales. Favorece de forma indirecta el desarrollo de frutos cuajados de palta.

K-ZOL, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea. Usar agua de pH 7-8. Aplicar en plantas en capacidad de campo y sólo cuando estas no presenten stress.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	APLICACIÓN	DOSIS	PC	LMR
		L/ha	(días)	(ppm)
Palto	Aplicar para limitar el crecimiento vegetativo de primavera y verano	3.0	120	0.5

PC: Periodo de carencia LMR: Límite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña (con un intervalo mínimo de 20 días) considerando una campaña por año. Aplicar la dosis indicada y dirigida cuidadosamente al árbol a fin de evitar afectar a plantas no objetivo.

PERIODO DE REINGRESO

Reingresar al área tratada después de 24 horas de aplicado.

COMPATIBILIDAD

K-ZOL es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso convencional.

FITOTOXICIDAD

K-ZOL no es fitotóxico al cultivo a la dosis recomendada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

