

19.5 ± 0.3 cm

1.0 ± 0.2

0.9 ± 0.2

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS".

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- El producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

CICOTOX: 328-7700    ESSALUD: 411-8000 (opción 4)  
CISPROQUIM: 0800-50847    NEOAGRUM S.A.C.: 01 617-6400

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**APLASTER®**

**400 SC**

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

**COMPOSICIÓN:**

Methoxyfenozide ..... 250 g/L  
Indoxacarb ..... 150 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 11

Reg. PQUA N° 2482 - SENASA

Titular del Registro, Importado y distribuido por:  
NEOAGRUM S.A.C.

**neogrum**

PJ. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla,  
Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400

Contenido neto: 250 mL

N° de Lote:  
F. de Form.: "Ver parte superior"  
F. de Venz.:

Formulado por:

HANGZHOU CHANGHE  
AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD.  
64 Riverside Wharf Road, Changhe Town,  
Hangzhou, Zhejiang Province, China.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

APLASTER® 400 SC es un insecticida que actúa por contacto e ingestión.

APLASTER® 400 SC consta de dos ingredientes activos: Methoxyfenozide, interrumpe la alimentación de las larvas, induce una muda larvaria prematura de pocas horas y mata al insecto en pocos días. Indoxacarb, ocasiona la pérdida de la función nerviosa, cese de la alimentación, parálisis y muerte del insecto.

Realizar una premezcla en un volumen reducido de agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea. Calibrar el equipo de pulverización antes de realizar la aplicación del producto. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L / 200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Espárrago	Gusano Cogollero	Spodoptera frugiperda	0.15 - 0.20	7	(a)0.01 (b)0.02

P.C.: Periodo de carencia  
Volumen agua: 800L/ha

L.M.R.: Límite máximo de residuos  
(a)Methoxyfenozide (b)Indoxacarb

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Se recomienda aplicar APLASTER® 400 SC una aplicación por campaña como máximo. Aplicar en la etapa de desarrollo vegetativo, a primeras horas de la mañana o por el atardecer cuando la plaga esté presente.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

6.0 ± 0.3 cm

1.2 cm



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

