

1.5 ± 0.3	1.5 ± 0.3
---------------	---------------

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
SAMU: 106 **NEOAGRUM S.A.C.: (01) 617-6400**

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- ### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abejas y artrópodos beneficiosos.
- No aplicar en época de floración del cultivo. No aplicar en presencia de polinizadores.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Notificar a los apicultores de áreas cercanas días antes de aplicar el producto para confinamiento de las abejas.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



400 SC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Methoxyfenozide 250 g/L

Indoxacarb	150 g/L
------------	---------

Aditivos c.s.p. 1 L

Req. PQUA N° 2482 - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEOGRUM S.A.C.



**Pje. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla
Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400**

Contenido neto: 200 L

Nº de Lote:

F. de Form.:

F. de Venc.:

Formulado por:

SINO CROP SCIENCE CORP LIMITED

29 Xiaohang Road, Nanjing, China.

NO CORROSIVO

NO INFLAMMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

APLASTER® 400 SC es un insecticida que actúa por contacto e ingestión.

APLASTER® 400 SC consta de dos ingredientes activos: Methoxyfenozide, interrumpe la alimentación de las larvas, induce una muda larvaria prematura de pocas horas y mata al insecto en pocos días. Indoxacarb, ocasiona la pérdida de la función nerviosa, cese de la alimentación, parálisis y muerte del insecto. Realizar una premezcla en un volumen reducido de agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea. Calibrar el equipo de pulverización antes de realizar la aplicación del producto. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L / 200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Arroz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.15 - 0.25	38	a) 0.05 b) 0.02
Espárrago	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.15 - 0.20	7	a) 0.01 b) 0.02
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.15 - 0.25	7	a) 0.02 b) 0.02
Palto	Bicho del cesto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	0.1 - 0.2	55	a) 0.7 b) 0.02
Pimiento	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Chloridea virescens</i>	0.15 - 0.20*	3	a) 2 b) 0.3

P.C.: Período de carencia
*Volumen de agua: 800 L/ha

L.M.R.: Límite máximo de residuos
(a)Methoxyfenozide (b)Indoxacarb

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar **APLASTER® 400C** (01) aplicación por campaña como máximo, considerando 1 campaña al año para el cultivo de arroz, espárrago, palto y pimiento. Para el cultivo de maíz se recomienda 01 aplicación por campaña considerando 02 campañas al año. La dosis máxima de aplicación para el maíz es de 0.5L/ha. Aplicar en la etapa de desarrollo vegetativo, a primeras horas de la mañana o por el atardecer cuando la placa está presente.

PERIODO DE REINGRESO:

Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido el periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD:

APLASTER® 400 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con materiales de oxidación y ácidos. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

