

31 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Benzimidazole (Carbendazim) + Triazole (Tebuconazole).
 - En caso de intoxicación: llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
 - En caso de ingestión: no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
 - En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
 - En caso de contacto con la piel retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIAS
SAMU: 106 - AGRIPAC PERÚ S.A.C.: 444-3663

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas fráticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



ROZZO

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Carbendazim..... 200 g/l
 Tebuconazole..... 100 g/l
 Aditivos c.s.p. 11

Reg. PQUA N° 2490 - SENASA

TITULAR DE REGISTRO:

AGRIPAC PERÚ SAC
 Av. José Pardo 223 INT. 41 - Miraflores - Perú
 Teléfono: 444 – 3663



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AGRIPAC PERÚ SAC
 Av. José Pardo 223 INT. 41 - Miraflores - Perú
 Teléfono: 444 – 3663

FORMULADO POR:

SHANGAI E-TONG CHEMICALS CO., LTD
 Room 1302, International Trade Building,
 Liming West Road, Wenzhou, China
 PBX: 86-577-88862798



CONTENIDO NETO: 1 litro

N° de Lote:

F. de Formulación:

F. de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
 CUIDADO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: ROZZO es un fungicida de acción sistémica con acción protectora, curativa y erradicante. Es absorbido rápidamente en las partes vegetativas de la planta, tiene desplazamiento a cropetal principalmente.

MODO DE EMPLEO: Vierta en el tanque de preparación la dosis a utilizar de ROZZO en la mitad de volumen de agua, agite bien y complete el volumen de agua requerido. Mantenga en agitación constante. No guardar la mezcla, aplique el mismo día de su preparación, aplicando desde la base hasta la zona apical de las plantas cubriendo en forma homogénea todo el follaje.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS l/ha	PC DÍAS	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Arroz (Oryza sativa)	Chupareda fungosa	Rhizoctonia solani	0.5	35	0.01*
Mango (Mangifera indica)	Oidiosis	Oidium mangiferae	0.4-0.5	20	0.5 ¹ 0.05 ²
Arándano (Vaccinium corymbosum)	Alternaria	Alternaria tenuissima	0.4-0.5	28	0.1 ¹ 1.5 ²

Carbendazim¹
 Tebuconazole²
PC.: Período de carencia en días.
LMR: Límite máximo de residuos (*)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar la aplicación cuando los cultivos de arroz, mango y arándano, presenten los primeros síntomas de la enfermedad. Realizar una aplicación por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO:

Al área tratada 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Por su componente Carbendazim, es incompatible con sustancias alcalinas. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad a pequeña escala previa a la aplicación.

FITOTOXICIDAD:

El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".



13,5 cm