0.50 cm 21.00 centímetros 0.50 cm

0.50 cm

30.00 centímetros

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Corbat®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Dimethomorph	90g/kg
Mancozeb	600 g/kg
Aditivos .....c.s.p.....	1 kg

Reg. PQUA Nº 617-SENASA

Titular del Registro: **FARMEX S.A.**
Calle Dean Valdivia Nº 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERÚ

Formulado por:
NANJING ESSENCE FINE CHEMICAL CO., LTD.
9th Floor, N° 58, Nanhu Road, Nanjing
Nanjing, 210017 – China.
Teléf.: +86 (25) 86518999.

Importado y distribuido por:

Farmex
Calle Dean Valdivia Nº 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERÚ
Teléfono: (01) 630-6400
www.farmex.com.pe

CONTENIDO NETO: 25 kg

Nº de lote :
Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

® Marca registrada de FARMEX S.A.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No almacenar en casas de habitación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
- **Grupo químico:** morfolinas y ditiocarbamatos.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada vía oral a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavarlos con abundante agua por 15 a 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados, lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a una zona ventilada, brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: no tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.
- **TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU 106, FARMEX S.A.: (01) 630-6400, CISPROQUIM: 080-050-847.**

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
CORBAT® es un fungicida con actividad de contacto, superficial, protectante, sistémico, curativa y antiesporulante. **CORBAT®** se aplica con equipos de aspersión manuales, a motor o montados sobre el tractor previamente calibrados. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/cil	kg/ha		
CEBOLLA	Mildiu	*Peronospora destructor*	1.0 - 1.5	-	7	*0.6 **1.5
PAPA	Rancha	*Phytophthora infestans*	-	2.0	14	*0.05 **0.02
VID	Mildiu	*Plasmopara viticola*	0.5	-	40	*3 **1.5

PC: Período de carencia. **LMR:** Límite máximo de residuos. *Dimethomorph, **Mancozeb.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN. Realizar máximo 2 aplicaciones por campaña/año, con un intervalo mínimo de 14 días, cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones climáticas favorezcan su desarrollo.

PERÍODO DE REINGRESO. No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

COMPATIBILIDAD. Es compatible con la mayoría de plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción muy alcalina (pH > 9), además de ser incompatible con agentes oxidantes y ácidos. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD. Se recomienda no aplicar **CORBAT®** en cebolla blanca o amarilla 30 días antes de la cosecha para evitar la presencia de un ligero manchado azul en las catáfilas de los bulbos. **CORBAT®** no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado en los cultivos y a las dosis recomendadas. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Versión 2

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

0.50 cm

0.50 cm