

1 cm

22.6 cm

0.5 cm

12 cm

1.8 cm

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es letal por ingestión, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos., ligera irritación a la piel.
- En contacto prolongado o repetido puede causar alergia a ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de la mezcla y aplicación del producto.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada las primeras 24 horas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Fipronil (Phenylpyrazole); Profenofos (Organofosforado)
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito a menos que así lo indique el médico. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente, solicitar atención médica inmediatamente.
- En caso de inhalación trasladar a la persona a un lugar fresco con ventilación natural.
- Antídoto: sulfato de atropina.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA CROP BUSINESS SAC: 349-2669
CICOTOX: 08001-3040

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido de este envase enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas y artrópodos beneficiosos, no aplicar en época de floración.
- Tóxico para los organismos acuáticos.
- No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el destinado por las autoridades locales para este fin.
- Respetar y una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 m.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.

FIPROFOS 570 MASTER EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición: Profenofos 500 g/L, Fipronil 70 g/L, Aditivos c.s.p. 1 L

Reg PQUA N° Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.

Importado y Distribuido por: CROP BUSINESS S.A.C.



Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación: Formulado por: RIDACHEM HONGKONG LIMITED
N° de Lote: 29-31 Chung Lee St. Chaiwan Hongkong
Contenido neto: 500 ml
Fecha de Vencimiento: CHINA

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO FIPROFOS MASTER 570 EC es un insecticida sistémico de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión. Tiene acción ovicida y también actividad translaminar.

FIPROFOS MASTER 570 EC es un insecticida de amplio espectro que tiene en su formulación dos ingredientes activos: fipronil y profenofos los cuales se complementan su acción sobre las plagas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Table with columns: CULTIVOS, PLAGA, DOSIS (L/200 L, L/ha), P.C. (días), L.M.R. (ppm). Rows include Espárrago (Mosquilla de los brotes) and Pimiento (Mosca blanca).

P.C.: Período de carencia (días) L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm; partes por millón) *Profenofos **Fipronil

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: FIPROFOS MASTER 570 EC debe ser aplicado cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga. Iniciar la aplicación de FIPROFOS MASTER 570 EC cuando se tenga un nivel de infestación de 5% de la plaga.

Se recomienda aplicar un máximo de 1 y 2 aplicaciones por campaña en el cultivo de espárrago y pimiento respectivamente; considerando para ambos cultivos 2 campañas/año.

PERIODO DE REINGRESO: Se recomienda re-ingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: FIPROFOS MASTER 570 EC no es fitotóxico si se usa a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones aquí dadas.



NOMBRE COMERCIAL NEGRO C:0 M:0 Y:0 K:100

PICTOGRAMA Banda toxicológica Pantone Yellow C:0 M:0 Y:100 K:0