

TK Root

AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO MICROBIANO

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Trichoderma harzianum.....200 g/kg (*)

Aditivosc.s.p. 1 kg

(*) Concentración mínima de 1 x10⁶ esporas/g

Reg.Nº - SENASA-PBA - ACBM

Titular del registro:



DESARROLLO TÉCNICO VEGETAL S.A.C.

Jr. Niquel Nº 282, Urb. Infantas
Los Olivos - Lima 39

Importado y Distribuido por:



Av. Separadora Industrial Mz. "E", Lote 12
Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate. Lima-Perú.
Telf.: 612-6565, R.U.C N° 20508704217

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: 5 kg.

Fecha de Vencimiento:

Formulado por:



INNOVAK COLOMBIA SAS

Carrera 6 17ª N° 7-13 Sopo
(Cundinamarca) - Colombia

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- El producto es tóxico si se ingiere o si se inhala.
- Se debe evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados. No exponer a radiación solar.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Durante el transporte y manipulación, proteger de la luz solar y alta temperatura.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS.

- En caso de intoxicación, retire a la persona de la zona peligrosa, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y/o hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión. No inducir al vómito. No proporcionar nada a una persona inconsciente. Busque inmediatamente atención médica.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Buscar atención médica si persiste irritación.
- En caso de contacto con la piel, quitarse las prendas contaminadas. Bañarse con abundante agua y jabón. Consultar al médico.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado y a la sombra.
- No tiene antídoto específico. Tratar según síntomas.

Teléfono de emergencia: Llamar a ESSALUD: 411 8000 anexo 4,
Infosalud: 0800-10-828, CICOTOX 0800-1-3040, DT Veg 544 4397

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No permita animales en las zonas tratadas.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- TK Root**, es un fungicida biológico, a base del organismo vivo de esporas del hongo *Trichoderma harzianum*. Estas cepas colonizan rápidamente las raíces de las plantas, actuando por antibiosis, parasitismo, competencia que inhiben la germinación de las esporas y el crecimiento de los microorganismos fitopatógenos.
- Método de aplicación: Utilice equipo de aplicación terrestre. Abra con cuidado el empaque con la ayuda de unas tijeras. Pese la cantidad indicada de **TK Root** y disuelva en suficiente agua para facilitar su incorporación.
- El producto debe ser conservado en su envase original. Aplique la solución que contenga el producto el mismo día de su preparación.
- El período de estabilidad de almacenamiento es de 12 meses.

"Consulte a un ingeniero agrónomo"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS Kg/Ha	P.C (días)	L.M.R (p.p.m)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Papa	Chupadera fungosa	<i>Rhizoctonia solani</i>	1.0	N.A	N.A
Pimiento	Azul o hiello	<i>Phytophthora capsici</i>	1.0	N.A	N.A
Palto	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	1.0	N.A	N.A

N.A. = No aplica.

P.C: Período de carencia (días)

L.M.R. = Límite máximo de residuo en partes por millón (ppm).

FRECUENCIA DE ÉPOCA Y APLICACIÓN:

- Aplicar previa evaluación y según el nivel de daño económico. Evitar condiciones de alta temperatura, no aplicar en caso de riesgo de lluvia. Se recomienda realizar dos aplicaciones cada 15 días por campaña de cultivo.
- Aplicar de preferencia al atardecer o noche

PERIODO DE REINGRESO

12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

TK Root no debe mezclarse con agentes oxidantes fuertes, ácidos o hidróxidos. Asegúrese que los equipos no tengan residuos de estos, así como fertilizantes amoniacales, azufre o cal.

FITOTOXICIDAD:

TK Root no es fitotóxico en el cultivo recomendado cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso listadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

PRECAUCION

