

# CAMPO STARMIX

## 280 SC

**FUNGICIDA AGRICOLA**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Azoxystrobin .....  | 200 g/L   |
| Cyproconazole ..... | 80 g/L    |
| Aditivos .....      | c.s.p.1 L |

**NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C.**  
Calle Enrique Palacios 360, Oficina No 505,  
Miraflores, Lima, Peru  
Teléfono: +51-1-222-2795



**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**  
Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,  
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.  
Teléfono: +86-574-87301088

**NGC AGROSCIENCIAS PERU S.A.C.**  
Calle Enrique Palacios 360, Oficina No 505,  
Miraflores, Lima, Peru  
Teléfono: +51-1-222-2795

Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

**Contenido Neto: 5 L**

**NO INFLAMMABLE**

**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Evitar contacto con la piel y ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

- **Grupo Químico: Estrobilurinas + Triazoles**
- En caso de ingestión, **no** inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso de inhalación, colocar al paciente a una zona del aire fresco. Aplicar respiración artificial si fuera necesario.
- **Antídoto:** Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

SAMU: 106

NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C.: (01) 222 2795

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inútilmente triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase.



- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi - acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro, a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**CAMPO STARMIX 280 SC** es la combinación de dos fungicidas, azoxystrobin y cyproconazole, **CAMPO STARMIX 280 SC** tiene actividad sistémica. Llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, agregar la dosis recomendada y remover, finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar. Agitar antes de usar.

| Cultivo  | Plaga           |                                 | Dosis<br>L/Ha | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm)   |
|----------|-----------------|---------------------------------|---------------|--------------|----------------|
|          | Nombre<br>Común | Nombre<br>Científico            |               |              |                |
| Pimiento | Mancha Negra    | <i>Alternaria<br/>alternata</i> | 0.45          | 45           | *0.05<br>**3.0 |

\*\* Azoxystrobin

Realizar como máximo una aplicación por campaña y dos campañas por año.  
Aplicar cuando el cultivo esté en activo crecimiento vegetativo o brotamiento.

**PERIODO DE REINGRESO**  
No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

No compatible con materiales de alta acidez o alcalinidad. se recomienda elaborar una pre-mezcla de pequeña escala para estudiar la compatibilidad de los productos.

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

