



26 x 15 cms

LEER CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENER EL PRODUCTO BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Puede ser letal si es inhalado. No respire la aspersión.
- Causa daño temporal a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: PiperidinyI thiazole isoxazoline (Oxathiapiprolin), Chloronitrile (Chlorothalonil).
 - En caso de Ingestión, llame al centro médico. No induzca al vomito. No administre nada oralmente a una persona inconsciente.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
 - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- TELEFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0800-13040
ESSALUD: 0801-10200 ó 4118000 anexo 4

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilizar el envase triturándolo o perforándolo y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales ó en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



ORONDIS OPTI

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

Suspensión Concentrada - SC

Composición

Chlorothalonil	400 g/L
Oxathiapiprolin	6 g/L
Aditivos	c.s.p. 1 L

Reg. PQUA No. 2500-SENASA

Titular del Registro:

Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú
Av. Manuel Olguín 335 Of. 808. Urb. Los Granados
Santiago de Surco, Lima.

Importado y Distribuido por:

TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.
Calle René Descartes No 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.
Lima - Perú.
Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020
R.U.C N° 20307150981

Formulado por:

Syngenta Crop Protection, LLC.
Estados Unidos

Lote N°: .

Fecha de Form.: .

Fecha de Venc.: .

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

CONTENIDO NETO

10 Litros

syngenta®

Los nombres de producto que comienzan de "a" a "n"
© Syngenta Crop Protection, S.A. y sus filiales.
Se permite la reproducción de esta información de Syngenta.

CO-06-20

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

Cultivo	Enfermedades		Dosis l/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Tomate	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	2.5	0	*5/ **0.5
Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	2.5	7	*0.5/**0.04
	Mancha púrpura	<i>Alternaria porri</i>			

P.C.: Periodo de Carencia

*Chlorothalonil

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos en partes por millón

**Oxathiapiprolin

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

- Aplicar ORONDIS OPTI desde 1 hasta 3 aplicaciones por campaña/año como máximo.
- No se requieren aplicaciones seguidas, se recomienda alternar con productos de diferentes grupos químicos.
- Para tomate, no aplique para la producción de plántulas.

PERIODO DE REINGRESO

- No reingresar al área tratada antes de las 12 horas posteriores a la aplicación.

COMPATIBILIDAD

- ORONDIS OPTI puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas más comúnmente utilizados. Se recomienda elaborar una pre-mezcla de pequeña escala para estudiar la compatibilidad de los productos.

FITOTOXICIDAD

- Siempre que ORONDIS OPTI se aplique de acuerdo a las indicaciones que se dan en la etiqueta, no se han reportado problemas de fitotoxicidad en los cultivos a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**