

Longitud Total 28.9 cm.

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es DÁNINO, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No comer el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar el producto conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación (guantes de goma, delantal, botas de goma, gafas, careta, gorro, máscara contra el polvo, respirador u otros) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Avermectinas
- Ingestión: hacer que la persona beba a sorbos un vaso de agua si lo puede ingerir. No inducir al vómito si la persona está inconsciente ni trate de introducir nada por la boca.
- Contacto con la piel: quite la ropa contaminada a la persona y lave cuidadosamente la piel con agua y jabón durante 15-20 minutos.
- Contacto con los ojos: lavar los ojos con abundante agua, durante 15-20 minutos.
- Inhalación: retirar del lugar contaminado a la persona y transportarla a un lugar bien ventilado. Dar respiración artificial o administrar oxígeno, si fuera necesario.

Nota al médico

- Antídoto: no existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.
- Teléfono de emergencia: CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398, AgroKlinge: (01) 612-6565
- Teléfono de emergencia: ESSALUD: 411-8000 Op. 4

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice, triturándolo y perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abejas y artrópodos beneficios.
- Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

© Marca Registrada



BAT[®] 1.8 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA-ACARICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:
Abamectin..... 18 g/L
Aditivos..... csp 1L

Reg. PQUA N° xxx - SENASA



Titular del Registro, Importador y Distribuidor:
Tecnología Química y Comercio S.A.
Calle René Descartes N° 311,
Urb. Santa Raquel 2da Etapa Ale. Lima-Perú.
Teléf.: 612-6565; Fax: 348-1020
R.U.C N° 20307150981

Formulado por:

Ningbo Generic Chemical Co., Ltd.
Room 10-6, Shidai Square,
N° 8, Lengjing Street, Ningbo 315010, Zhejiang,
China

Contenido
Neto: 1 L

Lote N°:
F. de Formulación:
F. de Vencimiento:

INFLAMABLE




NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO

DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

BAT 1.8 EC es un insecticida-acaricida que actúa por contacto e ingestión, con efectiva acción transaminar y buena persistencia sobre el folioleto. Eficaz en el control de los estadios móviles de ácaros, minadores de hojas e insectos picadores-chupadores que atacan a los cultivos que se muestran en el cuadro de uso. Puede ser utilizado en Programas de Manejo Integrado de Plagas.

BAT 1.8 EC es empleado en pulverizaciones en mezcla con agua. Aplicar uniformemente con cualquier equipo de aspersión terrestre.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS ml/cil. 200 L	P.C. L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO		
MANDARINO	"Minador de brotes"	<i>Phyllocnistis citrella</i>	---	7
	"Araña roja"	<i>Panonychus citri</i>		
PAPA	"Acaro hialino"	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	210-240	3
	"Mosca minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	310-400	
SANDÍA	"Araña roja"	<i>Tetranychus chinabarinus</i>	210-240	7

P.C. = Período de carencia L.M.R. = Límite máximo de residuos

VOLUMEN DE APLICACIÓN: Cultivos bajos: 400 a 600 L/ha-Frutales: 1.000 a 2.000 L/ha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar cuando se observen los primeros daños o cuando aparezcan los primeros ácaros. Repetir la aplicación en caso necesario con un intervalo de 7 días. Realizar máximo 2 aplicaciones seguidas o 3 alternadas por campaña/cultivo. Alternar o rote con acaricidas de diferentes grupos químicos.

PERÍODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas. Presenta fitotoxicidad a helechos *Adiantum* spp. y margaritas *Shasta leucanthemum* spp.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase, corresponderán a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"

Altura Total 13.5 cm.

Longitud Literal 27 cm.

Longitud de Color 28 cm.

09 cm