

INDOMABLE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN

Lambda Cyhalotrin..... 25 g/l
Fipronil..... 200 g/l
Aditivos c.s.p..... 11

Reg. PQUA N°:

Titular del Registro:

IMPORTADORA AGRÍCOLA DEL MONTE S.A.C.
Av. Jose Pardo N223 Of. 41, Distrito Miraflores - Lima - Perú

FORMULADO POR:

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:



HAILIR PESTICIDES AND CHEMICALS
GROUP CO., LTD.
No.216 Guocheng Road,Chengyang District,
Qingdao,China



DEL MONTE AG
IMPORTADORA AGRÍCOLA
DEL MONTE S.A.C.
Av. Jose Pardo N223 Of. 41,
Distrito Miraflores - Lima - Perú

Contenido neto: 20 litros
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:
P.V.P.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO APLICACIÓN

- Este producto es DÁNILO. No ingere. - Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspiración.
- Evite el contacto con la piel y la ropa. Evite el contacto con los ojos. Evite el contacto con los alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar el producto bajo llave en un lugar fresco, seco y ventilado. - No almacenar el producto en recipientes originalmente destinados para otros fines.
- Después de usar el producto lávese las manos con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en los primeros 24 horas después de la aplicación.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Evite el contacto con el agua.
- Grupo Químico: Lambda Cyhalotrin; Fipronil; Pirithroides. Fipronil: Phenylypyrazole.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de inhalación: retire a la persona del área contaminada y trasládela a un ambiente ventilado. Brindar respiración si fuera necesario.
- En caso de ingestión: no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos: lave con abundante agua, por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel: quite la ropa y cámbiese de ropa contaminada. Lávese con abundante agua y jabón.
- No se dispone de un antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.
- En caso de emergencia a llamar gratis a:

CICLOTAX: 0800-43040.

ESALUD: 0800-10200.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego utilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado para residuos.
- Realice las acciones locales para este fin.
- Evite el contacto con el agua.
- Evite el contacto con el agua.
- Evite el contacto con el agua.

RECOMENDACIONES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas. - Peligroso para organismos acuáticos. - Peligroso para aves y otros animales silvestres. - No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobranes del producto.
- No contaminar ríos, estuarios o arroyos con los desechos o envases vacíos. - No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar el contacto con el agua y evitar la contaminación de las fuentes de agua.
- El producto no debe aplicarse en zonas cercanas a fuentes de agua.
- En caso de derrames, el producto debe ser rescatado inmediatamente y depositado en un lugar seguro a fin de evitar su liberación hacia aguas subterráneas.

Instrucciones de uso y manejo:

- INDOMABLE es un insecticida no sistémico de contacto e ingestión. Actúa bloqueando los canales de cloro causando hiperexcitabilidad y convulsiones provocando la muerte del insecto.
- Preparación de la mezcla: Vierta en el tanque de preparación la dosis a utilizar de INDOMABLE en la mitad de volumen de agua, agite bien y complete el volumen de agua requerido. Mantenga en agitación constante. No guardar la mezcla. Aplique el mismo día de su preparación, aplicando desde la base hasta la zona apical de las plantas cubriendo en forma homogénea todo el follaje.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	HOMBRE COMÚN	PLAGA	DOSIS	PC	LHR
Arroz (Oryza sativa)	Segata	Segata	0.3	27	0.01**

PC: Período carencia en día.
LHR: Límite máximo de residuos (*) Lambda Cyhalotrin (*) Fipronil

Período de aplicación: Al menos 24 horas antes de la cosecha.

Período de aplicación: Al menos 24 horas antes de la cosecha.

Período de aplicación: Al menos 24 horas antes de la cosecha.

Período de aplicación: Al menos 24 horas antes de la cosecha.

Período de aplicación: Al menos 24 horas antes de la cosecha.

Período de aplicación: Al menos 24 horas antes de la cosecha.

Período de aplicación: Al menos 24 horas antes de la cosecha.

Período de aplicación: Al menos 24 horas antes de la cosecha.

Período de aplicación: Al menos 24 horas antes de la cosecha.

Período de aplicación: Al menos 24 horas antes de la cosecha.

Período de aplicación: Al menos 24 horas antes de la cosecha.

Período de aplicación: Al menos 24 horas antes de la cosecha.

Período de aplicación: Al menos 24 horas antes de la cosecha.

Período de aplicación: Al menos 24 horas antes de la cosecha.

Período de aplicación: Al menos 24 horas antes de la cosecha.

Período de aplicación: Al menos 24 horas antes de la cosecha.

Período de aplicación: Al menos 24 horas antes de la cosecha.

Período de aplicación: Al menos 24 horas antes de la cosecha.

Período de aplicación: Al menos 24 horas antes de la cosecha.

Período de aplicación: Al menos 24 horas antes de la cosecha.

Período de aplicación: Al menos 24 horas antes de la cosecha.

Período de aplicación: Al menos 24 horas antes de la cosecha.

Período de aplicación: Al menos 24 horas antes de la cosecha.

Período de aplicación: Al menos 24 horas antes de la cosecha.

Período de aplicación: Al menos 24 horas antes de la cosecha.

Período de aplicación: Al menos 24 horas antes de la cosecha.

Período de aplicación: Al menos 24 horas antes de la cosecha.

Período de aplicación: Al menos 24 horas antes de la cosecha.

Período de aplicación: Al menos 24 horas antes de la cosecha.

Período de aplicación: Al menos 24 horas antes de la cosecha.

Período de aplicación: Al menos 24 horas antes de la cosecha.

Período de aplicación: Al menos 24 horas antes de la cosecha.

Período de aplicación: Al menos 24 horas antes de la cosecha.

Período de aplicación: Al menos 24 horas antes de la cosecha.

Período de aplicación: Al menos 24 horas antes de la cosecha.

Período de aplicación: Al menos 24 horas antes de la cosecha.

Período de aplicación: Al menos 24 horas antes de la cosecha.

Período de aplicación: Al menos 24 horas antes de la cosecha.

Período de aplicación: Al menos 24 horas antes de la cosecha.

Período de aplicación: Al menos 24 horas antes de la cosecha.

Período de aplicación: Al menos 24 horas antes de la cosecha.

Período de aplicación: Al menos 24 horas antes de la cosecha.

Período de aplicación: Al menos 24 horas antes de la cosecha.

Período de aplicación: Al menos 24 horas antes de la cosecha.

Período de aplicación: Al menos 24 horas antes de la cosecha.