

INDOMABLE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN

Lambda Cyhalotrin.....25 g/L
Fipronil..... 200 g/L
Aditivos 1L

Reg. PQUA N° 2501-SENASA

TITULAR DE REGISTRO:

AGRIPAC PERÚ S.A.C®

Av. José Pardo 223 INT. 41 - Miraflores - Perú
Teléfono: +51 1 444 – 3663

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AGRIPAC PERÚ S.A.C®

Av. José Pardo 223 INT. 41 - Miraflores - Perú
Teléfono: +51 1 444 – 3663

FORMULADO POR:

HAILIR PESTICIDES AND CHEMICALS GROUP CO., LTD.
No.216 Guocheng Road, Chengyang District, Qingdao, China
Tel: +086 532 66961528



Agripac Perú S.A.C.



Contenido neto: 4 Litros
Lote No.:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:
P.V.P.:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO APLICACIÓN

- Este producto es DAÑINO . No ingerir . Peligroso si es inhalado . Evite respirar aspersión .
- No comer , beber o fumar durante la mezcla y aplicación del producto . Conservar el producto en el envase original bien tapado y etiquetado .
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco , seco y ventilado . No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos , medicinas , bebidas ni forrajes .
- Después de usar el producto cámbiese , lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón .
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo , aplicación y para ingresar al área tratado en los primeros 24 horas después de la aplicación .
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo .
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento .

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Lambda Cyhalotrin: Pyrethroids. Fipronil: Phenylpyrazole.
- En caso de intoxicación: llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de inhalación: retirar a la persona del área contaminada y trasladar a un ambiente ventilado . Brindar respiración si fuera necesario.
- En caso de ingestión: no inducir al vómito . No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua , por lo menos 15 minutos , cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel quitar la ropa y lavado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- No se dispone de un antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.
- En caso de emergencia a llamar gratis al:

CICOTOX: 0800-1-3040 - ESSALUD: 0800-1-0200.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido , enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo , triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Toxico para abejas. Peligroso para organismos acuáticos. Peligroso para abejas u otros artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración. No contaminar ríos , estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.

Peligroso para los animales domésticos , fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

En caso de derrames , el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

Instrucciones de uso y manejo :

INDOMABLE es un insecticida no sistémico de contacto e ingestión. Actúa bloqueando los canales de cloro causando hiperexcitabilidad y convulsiones provocando la muerte del insecto.

Preparación de la mezcla : Vierta en el tanque de preparación la dosis a utilizar de INDOMABLE en la mitad de volumen de agua , agite bien y complete el volumen de agua requerido . Mantenga en agitación constante. No guardar la mezcla, aplique el mismo día 1 de su preparación, aplicando 2 desde la base hasta la zona apical de las plantas cubriendo en forma homogénea todo el follaje.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS L/Ha	PC (Días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Arroz (Oryza sativa)	"Sogata"	Tagosodes orizicolus	0.3	27	1* 0.01**
	"Mosca minadora del arroz"	Hydrellia wirthi	0.3	30	0.2* 0.005**

PC: Periodo carencia . LMR: Límite máximo de residuos (*) Lambda-cyhalothrin (**) Fipronil

Época y frecuencia de aplicación: Se realiza una sola aplicación en etapa de desarrollo vegetativo y aparición de la plaga.

Periodo de ingreso: Al área tratada 24 horas después de la aplicación.

Fitotoxicidad: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a las dosis recomendadas.

Compatibilidad : Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala previa la aplicación.

Responsabilidad civil: "El Titular del Registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase 1 corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados , si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"

