

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es de cuidado, no ingerir.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.

Almacenar el producto bajo techo, en lugar fresco, seco y ventilado.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Derivado de microorganismos.

En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.

En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.

En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.

Antídoto: No existe antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

Teléfono de emergencia: **CICOTOX 0800-1-3040**.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devolva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

"Peligroso para organismos acuáticos".

"No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos".

"No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación de sobrantes del producto".

"Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros".

"Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre". "No permitir animales en el área tratada".

"El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva".

"El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables".

"En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas".



SUMIVAL 5 SL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Validamycin A 50 g/L

Aditivos c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° ---- SENASA

Titular de Registro e Importador:

SMTM PERU S.A.C

Av. República de Panamá 3531. Int. 1203, Lima - Perú

Formulado por:



SUMITOMO CHEMICAL

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LIMITED.

Plant Protección Division. 27-1, Shinkawa, 2-Chome, Chuo-ku.

Tokio 104-8260. Japón

Fecha de Formulación:

N° Lote:

Contenido neto: 5 Lt.

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SUMIVAL 5 SL es un nuevo fungicida de acción preventiva, curativa y erradicante, eficaz en el control de *Rhizoctonia solani* en los cultivos de arroz y papa.

SUMIVAL 5 SL impide la descomposición del Trehalase, disminuyendo la producción de glucosa, vital en el proceso de respiración y generación de energía del patógeno evitando el crecimiento de infecciones causadas por los patógenos.

Vaciar la dosis de **SUMIVAL 5 SL** en un balde con agua y agitarlo; vaciar la solución en un cilindro, completar con agua hasta el volumen deseado agitando constantemente.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Enfermedad		Dosis (L/Ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre científico	Nombre común			
Arroz	<i>Rhizoctonia solani</i>	Añublo de la vaina	1.0	5	0.06
Papa	<i>Rhizoctonia solani</i>	Chupadera fungosa	1.0 - 1.5	5	0.05

PC: Período de carencia. LMR: Límite Máximo de Residuos. N.D: No determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar **SUMIVAL 5 SL** hasta dos aplicaciones como máximo por campaña, considerando una frecuencia entre aplicaciones de 10 días y dos campañas por año.

Aplicar **SUMIVAL 5 SL** si se observan los primeros síntomas de la enfermedad o si las condiciones ambientales son favorables para el desarrollo de esta.

PERIODO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas después de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con la mayoría de productos alcalinos.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a los cultivos recomendados, al ser aplicado de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta y a las Buenas Prácticas Agrícolas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

01-0819



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

