TUMBADOR® 540WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

Gránulos dispersables (WG)

Composición:
Pyrazosulfuron ethyl: 40 g/kg
Quinclorac: 500 g/kg
Aditivos: c.s.p. 1kg

Registro PQUA Nº 2351- SENASA

Silvestre
Protección Vegetal

Titular de Registro:
SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18. Perú
Tel.: (01) 617-3300

Importado y Distribuido por:
SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: 1 kg **(2 bolsas de 500 g)**

F. de Form:
Nº Lote:
F. de Venc:

Formulado por:
NOVA CROP PROTECTION CO. LTD.
8 South Liyuan Road, Jiangning Dis.
Nanjing 211100 - CHINA.

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA, ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas, debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS
- **Grupo químico: Pyrazosulfuron ethyl: Pyrimidinylsulfonylurea, Quinclorac: Quinolinecarboxylic acid**
- Este producto no tiene antídoto específico: El tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar por vía oral si la persona esta inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0-800-1-3040
ESSALUD: 411 - 8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

TUMBADOR® 540WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

Gránulos dispersables (WG)

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA, ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
TUMBADOR® 540 WG es un herbicida que combina la acción de dos ingredientes activos: Pyrazosulfuron ethyl, sistemico selectivo, es absorbido por las raíces y el follaje y se trasloca a los meristemos y actúa inhibiendo la enzima acetolacto - ALS, las malezas detienen la toma de agua y de nutrientes una vez tratadas, luego detienen su crecimiento. Quinclorac es selectivo y post emergente principalmente para el control de malezas de hoja ancha y angosta.
TUMBADOR® 540 WG se emplea mezclando con agua limpia las dosis recomendadas en el cuadro de usos. Se aplica en aspersion foliar empleando cualquier equipo de aplicación terrestre (mochilas a palanca o motor, tecnomas, parihuelas, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado, usando el equipo de protección personal .

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/ha		
ARROZ	Coquito Moco de pavo Oreja de raton Rabo de zorro	*Cyperus rotundus* *Echinocloa crus-galli* *Commelina diffusa* *Leptochloa fusca*	0.5	95	0.1 (1) 5.0 (2)

PC: Período de Carencia (1) Pyrazosulfuron ethyl (2) Quinclorac **LMR:** Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Aplicar 10 días después de la siembra. Una aplicación por campaña, considerando una (01) campaña al año.
Máximo aplicar en arroz 0.5 kg/ha.

PERIODO DE REINGRESO
Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
TUMBADOR® 540 WG es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con agentes oxidante, ácidos, alcalinos y agua carbonatada. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD
TUMBADOR® 540 WG no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características fisico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA, ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido, destruya el envase y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para organismos acuáticos
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Medidas en cm.

ENVASE: Caja de cartón.