BATTEX 500 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE – WP

Dimethomorph .....500 g/kg
Aditivos .....c.s.p 1 kg

REG. PQUA N° -SENASA

Titular de Registro, Importado y Distribuido por:

Comercial Andina Industrial S.A.C.

Av. Benavides 1579 Oficina 702 Edificio Del Park II / Miraflores - Lima - Perú
Telf.: (01) 253-6444 - atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:
Agrohao Company Limited
Rm 601, No. 1, Green Land, Technology Square,
Lane 58, East XinJiang Road, Shangai, China
Tel: +86-21-34125555
Fax:+862154135819

Contenido Neto: 500g

Lote Nº:
Fecha de Fabricación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANSE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No Almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar este producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS
Grupo Químico: Morpholine
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomática.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducer al vómito sin supervision médica. No administrar nada por via oral si la persona esta inconsiente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado.
- Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CISPROQUIM: 0800-050-847 / ESSALUD: 0801- 10- 200
COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC: 01- 253-6444

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido, destruya el envase y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de aplicación, hacía cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora sílvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables
- En caso de derrames recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
BATTEX 500 WP (Dimethomorph 500 g/kg) del grupo químico de las morpholinas, actua impidiendo la formación de la pared celular de hongos oomycetes de la rancha o hielo. Es de acción sistemica.
Cuando se aplica al follaje, el compuesto penetra la superficie foliar y raíces, se transloca a través de las hojas por difusión. Si se aplica a la raíz, Dimethomorph se transloca sistemica y hacía arriba dentro de la planta a través del xilema.
Tiene actividad residual y es un protectante curative y antiesporulante.
Se puede aplicar con pulverizadores de mochila, motopulverizadores o equipos accionados por tractores. Llene el tanque o cilindro de aplicación hasta la mitad de la capacidad y agregue la premezcla y por último llene agitando constantemente.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Se recomienda aplicar BATTEX 500 WP, dos veces por campaña y una campaña al año para el cultivo de papa. Cuando las condiciones medioamentales sean favorables para el desarrollo del hongo o ante la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad.
Las aplicaciones deben de formar parte de un manejo integrado del cultivo. Se recomienda realizar hasta 2 aplicaciones con intervalos de 30 días, hacer rotaciones con productos sistémicos de diferente modo de acción y diferente grupo químico para evitar la aparición de la resistencia del hongo.

PERIODO DE REINGRESO
24 horas después de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD
BATTEX 500 WP se puede mezclar con la mayoria de plaguicidas de uso frecuentes. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de usar en campo definitive.

FITOTOXICIDAD
No se ha reportado fitotoxicidad a la dosis indicada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de Registro garantiza que las caracteristicas físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e intrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS Kg/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRECIENTÍFICO			
Papa	Hielo o Rancha	*Phytophthora infestans*	0.400	7	0.05

P.C:Periodo de carencia LMR: Limite Máximo de Residuos