

"LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (aspersión).
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para reingresar al área tratada antes de las 24 horas.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar bajo techo en un lugar fresco y seco, bien ventilado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Dicarboximida
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua al menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retire los vestidos contaminados y lave la piel afectada con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retire al paciente del sitio de intoxicación, llévelo a un sitio alejado para que respire aire fresco y déjelo en reposo. Si presenta dificultades para respirar, dar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No posee antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX 0-800-1-3040, 328-7700
ESSALUD 411-8000 (opción 4)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido de este envase enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todos los medios necesarios para controlar la deriva.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- En caso de derrame del producto esparza un material seco o absorba el derrame con un material convenientemente absorbente, removiéndolo hacia un contenedor cerrado para su disposición final. Zanje los derrames y evite el vertido de los líquidos en alcantarillas, canales o áreas bajas.

PROCIMIFIN

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Procymidone 500 g/L
Aditivos csp 1L

Reg. PQUA No. - SENASA



Titular de Registro: Rotam Agrochemical Perú SA

Formulado por:
Jiangsu Rotam Chemistry Co., Ltd.
No. 88 Rotam Road, ETDZ, Kunshan,
Jiangsu, 215301, China.
Tel: 86 512 57711988

Importado y Distribuido por:
ROTAM AGROCHEMICAL PERU SA
Calle Los Tulipanes 147, Of. 304, Surco
Lima – Peru. Telef. 719 - 4085

CONTENIDO NETO: 1 L

Número de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PROCIMIFIN es un fungicida formulado a base de Procymidone, tiene actividad sistémica, inhibe la germinación de esporas, el crecimiento micelial y la síntesis de triglicéridos en hongos. Se aplica para el control de la "podredumbre gris" *Botrytis cinerea* en el cultivo de fresa.

PROCIMIFIN debe ser aplicado usando una mochila manual u otro equipo de aplicación.

Diluir la dosis recomendada en una cantidad parcial de agua, y luego añadir más agua hasta completar el volumen final.

"Consulte con un Ingeniero agrónomo"

Cultivo	Plaga		Dosis (L/200 L)	PC (Días)	LMR (ppm)
	N. Común	N. Científico			
Fresa	"Podredumbre gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0.15	14	5

PC: Período de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se realizará una sola aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al área tratada antes de las 24 horas de aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso agrícola.

FITOTOXICIDAD

No hay fitotoxicidad usando la dosis recomendada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

