

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTENGANSE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- El producto es nocivo por ingestión y contacto con la piel.
- Usar lentes protectores y respirador cuando se manipule el producto.
- No utilice este envase para conservar alimentos o agua.

PRIMERO AUXILIOS

- Grupo químico: Piretroide
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- Antídoto: no hay antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: (01) 328-7700 / ESSALUD: (01) 411-8000 opción 4
INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS: (01) 499-7831

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Utilizar una banda de protección hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.

CONTACTO[®]

10 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Alpha-cypermethrin 100 g/L
 Aditivos c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 2512 - SENASA

Titular Del Registro, Importador y Distribuidor:

INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.

Av. Javier Prado Este N° 6726 Int. 301-A

Urb. Santa Patricia II Etapa

La Molina, Lima, Perú

Teléfono: (01) 499-7831

Formulado por:

Point Agro - China Ltd.

Wan Shi Town, Yixing, Jiangsu 214217. China

Contenido Neto : 0.5 L
 Lote N° :
 Fecha de formulación :
 Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CONTACTO 10 EC es un insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión, y es empleado en el control de las plagas recomendadas en esta etiqueta.

Para su preparación, llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, agregar la dosis recomendada y remover, finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar. Realizar la aplicación con equipo de aspersión manual o mecánico tratando de efectuar una aplicación uniforme.

Se recomienda que, diluido el producto, no puede ser almacenado por más de 12 horas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivos	Plaga		Dosis (ml/200 L)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Alfalfa	“Gusano ejército”	<i>Spodoptera</i> spp.	125	14	0,5
Algodón	“Gusano rosado”	<i>Pectinophora gossypiella</i>	125	14	0,1
	“Arrebiatado”	<i>Dysdercus peruvianus</i>	125	14	0,1
Col	“Gusano de hoja”	<i>Plutella</i> spp.	125	14	1,0
Frijol	“Gusano medidor”	<i>Chrysodeixis</i> spp.	150	14	0,05
Maíz	“Cogollero”	<i>Spodoptera frugiperda</i>	125	14	0,05
Papa	“Mosca minadora” (adultos)	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	100	14	0,05
Sandía	“Perforador de guías”	<i>Diaphania</i> spp.	125	14	0,05
Tomate	“Polilla”	<i>Tuta absoluta</i>	150	14	0,1

LMR= Límite máximo de Residuos en partes por millón (ppm) P.C.= Período de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar cuando se observe las primeras posturas y/o larvas. Número máximo de aplicaciones: 4 campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas como mínimo.

COMPATIBILIDAD: No compatible con materiales de alta acidez o alcalinidad.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico usado a la dosis recomendada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



Pantone Yellow C



Triangulo- Pantone 555 C



Gota - Pantone 639 C