

- LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**
- "MANTENGANSE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**
- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
 - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
 - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
 - El producto es nocivo por ingestión y contacto con la piel.
 - Usar lentes protectores y respirador cuando se manipule el producto.
 - No utilice este envase para conservar alimentos o agua.

PRIMERO AUXILIOS

- Grupo químico: Pirетроиде
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lávela con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- Antídoto: no hay antídoto específico.

Teléfonos de Emergencia:

CICOTEX: (01) 3287700 / ESSALUD: (01) 411 8000 opción 4
POINT ANDINA S.A.: (01) 3481018

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas y artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Utilizar una banda de protección hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.

CONTACTO[®]

10 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:
Alpha-cypermethrin 100 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° -SENASA

Titular Del Registro, Importador y Distribuidor:

POINT ANDINA S.A
Calle Loreto 304
Urb. Sta Patricia, II Etapa
La Molina, Lima - Perú
Teléfono 348-1018/348-9609

Formulado por:

Point Agro - China Ltd.
Wan Shi Town, Yixing, Jiangsu 214217, China
Tel (86 - 510) 8785 1001
Fax 8785 1537

Contenido Neto : 200 L

Lote N° :

Fecha de formulación :

Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CONTACTO 10 EC es un insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión, y es empleado en el control de las plagas recomendadas en esta etiqueta.

Para su preparación, llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, agregar la dosis recomendada y remover, finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar. Realizar la aplicación con equipo de aspersión manual o mecánico tratando de efectuar una aplicación uniforme.

Se recomienda que, diluido el producto, no puede ser almacenado por más de 12 horas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivos	Plaga		Dosis ml/200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
Alfalfa ¹	Gusano ejército	Spodoptera spp.	125	14	0.5
Algodón	Gusano rosado	Pectinophora gossypiella	125	14	0.1
	Arrebiatado	Dysdercus peruvianus	125	14	0.1
Col	Gusano de hoja	Plutella spp.	125	14	1.0
Frijol	Gusano medidor	Chrysodeixis spp.	150	14	0.05
Maíz	Cogollero	Spodoptera frugiperda	125	14	0.05
Papa	Mosca minadora (adultos)	Liriomyza huidobrensis	100	14	0.05
Sandía	Perforador de guías	Diaphania spp.	125	14	0.05
Tomate	Pollita	Tuta absoluta	150	14	0.1

LMR= Límite máximo de Residualidad, en partes por millón (ppm) P.C.= Período de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar cuando se observe las primeras posuras y/o larvas. Número máximo de aplicaciones: 4 campaña/año.

PERÍODO DE REINGRESO: 24 horas como mínimo.

COMPATIBILIDAD: No compatible con materiales de alta acidez o alcalinidad.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico usado a la dosis recomendada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

Pantone Yellow C

Triangulo- Pantone 555 C

Gota - Pantone 639 C