

41.25 cm

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
 “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# TRIUNFADOR<sup>®</sup> 20SP

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA  
 POLVO SOLUBLE (SP)

### COMPOSICIÓN:

Acetamiprid ..... 200 g/Kg  
 Aditivos ..... c.s.p. 1Kg

Reg. PQUA N° 2516 - SENASA

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:** • Tóxico y altamente peligroso por inhalación, evitar respirar el polvo de la aspersión. • Altamente irritante al tracto y vías respiratorias. • Tóxico por ingestión. • Ligeramente irritante a la piel y a los ojos. • No reutilizar los envases vacíos para almacenar alimentos ni bebidas. • Almacenar el producto en ambiente fresco y ventilado, fuera de ambientes habitados por personas o animales. • No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. • Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. • Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. • Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación. • Ingresar al área tratada después de 48 horas de utilizado el producto. • No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. • Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. • Utilizar mascarilla de protección durante la mezcla y aplicación del producto. **INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:** • Grupo químico: Neonicotinoide. • En caso de intoxicación oral o inhalatoria lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta. • En caso de ingestión accidental conviene vaciar el estómago induciendo al vómito, eliminar artificialmente la parte ingerida realizando el aspirado y lavado gástrico con una solución de bicarbonato de sodio al 5%. • No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106; INAP: (01) 499-7831**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:** Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión. **MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:** • No aplicar en época de floración del cultivo. • No aplicar en presencia de polinizadores. • Aplicar al atardecer o temprano en la mañana. • No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños. • No utilizar cuando las abejas se encuentran en época de alimentación activa. No aplicar en presencia del viento, a fin de reducir la deriva. • Evitar que la aplicación esté dirigida a otro tipo de vegetación en floración que atraen polinizadores. • Peligroso para organismos acuáticos.



**Titular del registro:**  
**INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.**

Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.  
 Santiago de Surco, Lima – Perú.  
 Teléfono: (01) 499-7831

**Formulado por: POINT AGRO-CHINA LTD**  
 Rm 1206, Kaisa Plaza, 1091 East Renmin Road  
 Jiangyin, Jiangsu, China

**Importado y distribuido por:**  
**PERÚ PRODUCTOS AGRÍCOLAS S.A.C.**  
 Av. Nicolás Arriola N° 2374, San Luis  
 Teléfono: (01) 547-0638

**Contenido Neto: 40 Kg**

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

• No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. • No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. • Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros. • Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. • El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. • En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: TRIUNFADOR 20 SP** es un insecticida que presenta como ingrediente activo al acetamiprid que pertenece al grupo de los neonicotinoideos. Presenta una acción sistémica, de contacto y translaminar. Es absorbido rápidamente por el follaje y su penetración asegura una rápida residualidad. **TRIUNFADOR 20 SP** afecta el sistema nervioso de los insectos causándoles la muerte; además tiene un efecto sobre huevos, ninfas y adultos de insectos. Las aplicaciones de **TRIUNFADOR 20 SP** se realizan en campo abierto y en condiciones de invernadero requiriendo para ello la utilización de equipos de protección. Diluir la dosis recomendada en agua limpia. El volumen de agua depende de cada cultivo y el momento fenológico: en algodón y tomate el valor referencial es 400 L/ha, en palto y vid es 1000 L/ha, en mango es 1500 L/ha. El pH del agua se recomienda entre 6 y 7. **FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Realizar máximo 1 aplicación/campaña/año de **TRIUNFADOR 20 SP** en tomate, algodón, palto, vid y mango. Aplicar en el desarrollo vegetativo del cultivo y dependiendo del grado de infestación de la plaga. **PERÍODO DE REINGRESO:** Se puede ingresar al campo sin equipo de protección 48 horas después de aplicado el producto. **COMPATIBILIDAD: TRIUNFADOR 20 SP** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina. **FITOTOXICIDAD:** La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos. **RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/200 L	Kg/ha		
Algodón	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.2 - 0.25	0.4 - 0.5	14	0.5
Tomate	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.1 - 0.15	-	7	0.2
Palto	Queresa	<i>Fiorinia fioriniae</i>	0.1	0.5	47	0.01
Mango	Escama del mango	<i>Milviscutulus mangiferae</i>	0.15	1.125	1	0.5

PC: Período de carencia en días. LMR: Límite máximo de residuos expresados en ppm

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
 CUIDADO**



46.75 cm