

25 cm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# TRIUNFADOR<sup>®</sup> 20SP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

**COMPOSICIÓN:**

Acetamiprid .....	200 g/Kg
Aditivos .....	c.s.p. 1Kg

Reg. PQUA N° 2516 - SENASA



Titular del registro:  
**INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.**  
 Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.  
 Santiago de Surco, Lima – Perú.  
 Teléfono: (01) 499-7831

Formulado por: **POINT AGRO-CHINA LTD**  
 Rm 1206, Kaisa Plaza, 1091 East Renmin Road  
 Jiangyin, Jiangsu, China

Importado y distribuido por:  
**PERÚ PRODUCTOS AGRÍCOLAS S.A.C.**  
 Av. Nicolás Arriola N° 2374, San Luis  
 Teléfono: (01) 547-0638

Contenido Neto: 1Kg

N° de Lote:  
 Fecha de Formulación:  
 Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
 CUIDADO**

25 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
 "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Tóxico y altamente peligroso por inhalación, evitar respirar el polvo de la aspersión
- Altamente irritante al tracto y vías respiratorias.
- Tóxico por ingestión.
- Ligeramente irritante a la piel y a los ojos.
- No reutilizar los envases vacíos para almacenar alimentos ni bebidas.
- Almacenar el producto en ambiente fresco y ventilado, fuera de ambientes habitados por personas o animales.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación
- Ingresar al área tratada después de 48 horas de utilizado el producto.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilizar mascarilla de protección durante la mezcla y aplicación del producto.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: Neonicotinoide
- En caso de intoxicación oral o inhalatoria lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión accidental conviene vaciar el estómago induciendo al vómito, eliminar artificialmente la parte ingerida realizando el aspirado y lavado gástrico con una solución de bicarbonato de sodio al 5%.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106; INAP: (01) 499-7831

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobantes del producto.

- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**TRIUNFADOR 20 SP** es un insecticida que presenta como ingrediente activo al acetamiprid que pertenece al grupo de los neonicotinoídes. Presenta una acción sistémica, de contacto y translaminar. Es absorbido rápidamente por el follaje y su penetración asegura una rápida residualidad. **TRIUNFADOR 20 SP** afecta el sistema nervioso de los insectos causando la muerte; además tiene un efecto sobre huevos, ninfas y adultos de insectos. Las aplicaciones de **TRIUNFADOR 20 SP** se realizan en campo abierto y en condiciones de invernadero requiriendo para ello la utilización de equipos de protección. Diluir la dosis recomendada en agua limpia. El volumen de agua depende de cada cultivo y el momento fenológico; en algodón y tomate el valor referencial es 400 L/ha, en palto y vid es 1000 L/ha, en mandarina es 1000-1500 L/ha. El pH del agua se recomienda entre 6 y 7.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Realizar máximo 1 aplicación/campaña/año de **TRIUNFADOR 20 SP** en tomate, algodón, palto y vid. Aplicar en el desarrollo vegetativo del cultivo y dependiendo del grado de infestación de la plaga.

**PERIODO DE REINGRESO:**

Se puede ingresar al campo sin equipo de protección 48 horas después de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD:**

**TRIUNFADOR 20 SP** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/200 L	g/ha		
Algodón	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	200 - 250	400 - 500	14	0.5
Tomate	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	100 - 150	-	7	0.2
Palto	Queresa	<i>Fiorinia fioriniae</i>	100	500	47	0.01
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i>	150	750	3	0.5
Mandarina	Queresa coma	<i>Lepidosaphes beckii</i>	100 - 200	-	7	1

PC: Período de carencia en días. LMR: Límite máximo de residuos expresados en ppm



26 cm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# TRIUNFADOR<sup>®</sup> 20SP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

**COMPOSICIÓN:**

Acetamiprid ..... 200 g/Kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1Kg

Reg. PQUA N° 2516 - SENASA



**Titular del registro:**  
**INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.**  
Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.  
Santiago de Surco, Lima – Perú.  
Teléfono: (01) 499-7831

**Formulado por:** POINT AGRO-CHINA LTD  
Rm 1206, Kaisa Plaza, 1091 East Renmin Road  
Jiangyin, Jiangsu, China

**Importado y distribuido por:**  
**PERÚ PRODUCTOS AGRÍCOLAS S.A.C.**  
Av. Nicolás Arriola N° 2374, San Luis  
Teléfono: (01) 547-0638

**Contenido Neto: 500g**  
N° de Lote:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

36 cm

26 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Tóxico y altamente peligroso por inhalación, evitar respirar el polvo de la aspersión
- Altamente irritante al tracto y vías respiratorias.
- Tóxico por ingestión.
- Ligeramente irritante a la piel y a los ojos.
- No reutilizar los envases vacíos para almacenar alimentos ni bebidas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación
- Ingresar al área tratada después de 48 horas de utilizado el producto.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilizar mascarilla de protección durante la mezcla y aplicación del producto.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: Neonicotinoide
- En caso de intoxicación oral o inhalatoria lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión accidental conviene vaciar el estómago induciendo al vómito, eliminar artificialmente la parte ingerida realizando el aspirado y lavado gástrico con una solución de bicarbonato de sodio al 5%.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106; INAP: (01) 499-7831

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inútilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.

- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**TRIUNFADOR 20 SP** es un insecticida que presenta como ingrediente activo al acetamiprid que pertenece al grupo de los neonicotinoideos. Presenta una acción sistémica, de contacto y translaminar. Es absorbido rápidamente por el follaje y su penetración asegura una rápida residualidad. **TRIUNFADOR 20 SP** afecta el sistema nervioso de los insectos causándoles la muerte; además tiene un efecto sobre huevos, ninfas y adultos de insectos. Las aplicaciones de **TRIUNFADOR 20 SP** se realizan en campo abierto y en condiciones de invernadero requiriendo para ello la utilización de equipos de protección. Diluir la dosis recomendada en agua limpia. El volumen de agua depende de cada cultivo y el momento fenológico: en algodón y tomate el valor referencial es 400 L/ha, en palto y vid es 1000 L/ha, en mandarina es 1000-1500 L/ha. El ph del agua se recomienda entre 6 y 7.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Realizar máximo 1 aplicación/campaña/año de **TRIUNFADOR 20 SP** en tomate, algodón, palto y vid. Aplicar en el desarrollo vegetativo del cultivo y dependiendo del grado de infestación de la plaga.

**PERIODO DE REINGRESO:**

Se puede ingresar al campo sin equipo de protección 48 horas después de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD:**

**TRIUNFADOR 20 SP** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/200 L	g/ha		
Algodón	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	200 - 250	400 - 500	14	0.5
Tomate	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	100 - 150	-	7	0.2
Palto	Queresa	<i>Fiorinia fioriniae</i>	100	500	47	0.01
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i>	150	750	3	0.5
Mandarina	Queresa coma	<i>Lepidosaphes beckii</i>	100-200	-	7	1

PC: Período de carencia en días. LMR: Límite máximo de residuos expresados en ppm

36 cm



14 cm

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# TRIUNFADOR<sup>®</sup> 20SP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**  
POLVO SOLUBLE (SP)

**COMPOSICIÓN:**

Acetamiprid ..... 200 g/Kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1Kg

Reg. PQUA N° 2516 - SENASA



**Titular del registro:**  
**INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.**  
Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.  
Santiago de Surco, Lima – Perú.  
Teléfono: (01) 499-7831

**Formulado por: POINT AGRO-CHINA LTD**  
Rm 1206, Kaisa Plaza, 1091 East Renmin Road  
Jiangyin, Jiangsu, China

**Importado y distribuido por:**  
**PERÚ PRODUCTOS AGRÍCOLAS S.A.C.**  
Av. Nicolás Arriola N° 2374, San Luis  
Teléfono: (01) 547-0638

Contenido Neto: 200g  
N° de Lote:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

19 cm

14 cm

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Tóxico y altamente peligroso por inhalación, evitar respirar el polvo de la aspersión
- Altamente irritante al tracto y vías respiratorias.
- Tóxico por ingestión.
- Ligeramente irritante a la piel y a los ojos.
- No reutilizar los envases vacíos para almacenar alimentos ni bebidas.
- Almacenar el producto en ambiente fresco y ventilado, fuera de ambientes habitados por personas o animales.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación
- Ingresar al área tratada después de 48 horas de utilizado el producto.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilizar mascarilla de protección durante la mezcla y aplicación del producto.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: Neonicotinoide
- En caso de intoxicación oral o inhalatoria lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión accidental conviene vaciar el estómago induciendo al vómito, eliminar artificialmente la parte ingerida realizando el aspirado y lavado gástrico con una solución de bicarbonato de sodio al 5%.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106; INAP: (01) 499-7831**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entreguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**TRIUNFADOR 20 SP** es un insecticida que presenta como ingrediente activo al acetamiprid que pertenece al grupo de los neonicotinoideos. Presenta una acción sistémica, de contacto y translaminar. Es absorbido rápidamente por el follaje y su penetración asegura una rápida residualidad. **TRIUNFADOR 20 SP** afecta el sistema nervioso de los insectos causándoles la muerte, además tiene un efecto sobre huevos, ninfas y adultos de insectos. Las aplicaciones de **TRIUNFADOR 20 SP** se realizan en campo abierto y en condiciones de invernadero requiriendo para ello la utilización de equipos de protección. Diluir la dosis recomendada en agua limpia. El volumen de agua depende de cada cultivo y el momento fenológico. En algodón y tomate el valor referencial es 400 L/ha, en palto y vid es 1000 L/ha, en mandarina es 1000-1500 L/ha. El ph del agua se recomienda entre 6 y 7.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Realizar máximo 1 aplicación/campaña/año de **TRIUNFADOR 20 SP** en tomate, algodón, palto y vid. Aplicar en el desarrollo vegetativo del cultivo y dependiendo del grado de infestación de la plaga.

**PERIODO DE REINGRESO:** Se puede ingresar al campo sin equipo de protección 48 horas después de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD:**

**TRIUNFADOR 20 SP** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/200 L	g/ha		
Algodón	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	200 - 250	400 - 500	14	0.5
Tomate	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	100 - 150	-	7	0.2
Palto	Queresa	<i>Fiorinia florinae</i>	100	500	47	0.01
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i>	150	750	3	0.5
Mandarina	Queresa coma	<i>Lepidosaphes beckii</i>	100-200	-	7	1

PC: Período de carencia en días. LMR: Límite máximo de residuos expresados en ppm

19 cm



13 cm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# TRIUNFADOR<sup>®</sup> 20SP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

**COMPOSICIÓN:**

Acetamiprid ..... 200 g/Kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1Kg

Reg. PQUA N° 2516 - SENASA



Titular del registro:  
**INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.**  
Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.  
Santiago de Surco, Lima – Perú.  
Teléfono: (01) 499-7831

Formulado por: **POINT AGRO-CHINA LTD**  
Rm 1206, Kaisa Plaza, 1091 East Renmin Road  
Jiangyin, Jiangsu, China

Importado y distribuido por:  
**PERÚ PRODUCTOS AGRÍCOLAS S.A.C.**  
Av. Nicolás Arriola N° 2374, San Luis  
Teléfono: (01) 547-0638

Contenido Neto: 100g  
N° de Lote:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

16 cm

13 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Ligeramente irritante a la piel y a los ojos.
- No reutilizar los envases vacíos para almacenar alimentos ni bebidas.
- Almacenar el producto en ambiente fresco y ventilado, fuera de ambientes habitados por personas o animales.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación
- Ingresar al área tratada después de 48 horas de utilizado el producto.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilizar mascarilla de protección durante la mezcla y aplicación del producto.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: Neonicotinoide
- En caso de intoxicación oral o inhalatoria lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión accidental conviene vaciar el estómago induciendo al vómito, eliminar artificialmente la parte ingerida realizando el aspirado y lavado gástrico con una solución de bicarbonato de sodio al 5%.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106; INAP: (01) 499-7831

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:** Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/200 L	g/ha		
Algodón	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	200 - 250	400 - 500	14	0.5
Tomate	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	100 - 150	-	7	0.2
Páto	Queresa	<i>Fiorinia fioriniae</i>	100	500	47	0.01
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i>	150	750	3	0.5
Mandarina	Queresa coma	<i>Lepidosaphes beckii</i>	100-200	-	7	1

PC: Período de carencia en días. LMR: Límite máximo de residuos expresados en ppm



16 cm

15 cm

# TRIUNFADOR<sup>®</sup> 20SP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**  
**POLVO SOLUBLE (SP)**
**COMPOSICIÓN:**
 Acetamiprid ..... 200 g/Kg  
 Aditivos ..... c.s.p. 1Kg

Reg. PQUA N° 2516 - SENASA

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**  
**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:** • Tóxico y altamente peligroso por inhalación, evitar respirar el polvo de la aspersión. • Altamente irritante al tracto y vías respiratorias. • Tóxico por ingestión. • Ligeramente irritante a la piel y a los ojos. • No reutilizar los envases vacíos para almacenar alimentos ni bebidas. • Almacenar el producto en ambiente fresco y ventilado, fuera de ambientes habitados por personas o animales. • No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. • Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. • Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. • Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación. • Ingresar al área tratada después de 48 horas de utilizado el producto. • No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. • Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. • Utilizar mascarilla de protección durante la mezcla y aplicación del producto. **INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:** • Grupo químico: Neonicotinoide. • En caso de intoxicación oral o inhalatoria lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta. • En caso de ingestión accidental conviene vaciar el estómago induciendo al vómito, eliminar artificialmente la parte ingerida realizando el aspirado y lavado gástrico con una solución de bicarbonato de sodio al 5%. • No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106; INAP: (01) 499-7831

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:** Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión. **MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:** Peligroso para organismos acuáticos. • No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. • No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. • Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros. • El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.



**Titular del registro:**  
**INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.**  
 Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.  
 Santiago de Surco, Lima – Perú.  
 Teléfono: (01) 499-7831

**Formulado por:** POINT AGRO-CHINA LTD  
 Rm 1206, Kaisa Plaza, 1091 East Renmin Road  
 Jiangyin, Jiangsu, China

**Importado y distribuido por:**  
**PERÚ PRODUCTOS AGRÍCOLAS S.A.C.**  
 Av. Nicolás Arriola N° 2374, San Luis  
 Teléfono: (01) 517-0688

Contenido Neto: 25 Kg

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**


• Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. • En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin. **INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:** TRIUNFADOR 20 SP es un insecticida que presenta como ingrediente activo al acetamiprid que pertenece al grupo de los neonicotinoideos. Presenta una acción sistémica, de contacto y translaminar. Es absorbido rápidamente por el follaje y su penetración asegura una rápida residualidad. TRIUNFADOR 20 SP afecta el sistema nervioso de los insectos causándoles la muerte; además tiene un efecto sobre huevos, ninfas y adultos de insectos. Las aplicaciones de TRIUNFADOR 20 SP se realizan en campo abierto y en condiciones de invernadero requiriendo para ello la utilización de equipos de protección. Diluir la dosis recomendada en agua limpia. El volumen de agua depende de cada cultivo y el momento fenológico: en algodón y tomate el valor referencial es 400 L/ha, en palto y vid es 1000 L/ha, en mandarina es 1000-1500 L/ha. El pH del agua se recomienda entre 6 y 7. **FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Realizar máximo 1 aplicación/campaña/año de TRIUNFADOR 20 SP en tomate, algodón, palto y vid. Aplicar en el desarrollo vegetativo del cultivo y dependiendo del grado de infestación de la plaga. **PERÍODO DE REINGRESO:** Se puede ingresar al campo sin equipo de protección 48 horas después de aplicado el producto. **COMPATIBILIDAD:** TRIUNFADOR 20 SP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina. **FITOTOXICIDAD:** La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos. **RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/200 L	g/ha		
Algodón	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	200 - 250	400 - 500	14	0.5
Tomate	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	100 - 150	-	7	0.2
Palto	Queresa	<i>Floricaria florinae</i>	100	500	47	0.01
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i>	150	750	3	0.5
Mandarina	Queresa coma	<i>Lepidosaphes beckii</i>	100-200	-	7	1

PC: Período de carencia en días. LMR: Límite máximo de residuos expresados en ppm

17 cm

15 cm

# TRIUNFADOR<sup>®</sup> 20SP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

**COMPOSICIÓN:**

Acetamiprid ..... 200 g/Kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1Kg

Reg. PQUA N° 2516 - SENASA

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:** • Tóxico y altamente peligroso por inhalación, evitar respirar el polvo de la aspersión. • Altamente irritante al tracto y vías respiratorias. • Tóxico por ingestión. • Ligeramente irritante a la piel y a los ojos. • No reutilizar los envases vacíos para almacenar alimentos ni bebidas. • Almacenar el producto en ambiente fresco y ventilado, fuera de ambientes habitados por personas o animales. • No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. • Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. • Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. • Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación. • Ingresar al área tratada después de 48 horas de utilizado el producto. • No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. • Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. • Utilizar mascarilla de protección durante la mezcla y aplicación del producto. **INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:** • Grupo químico: Neonicotinoide. • En caso de intoxicación oral o inhalatoria lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta. • En caso de ingestión accidental conviene vaciar el estómago induciendo al vómito, eliminar artificialmente la parte ingerida realizando el aspirado y lavado gástrico con una solución de bicarbonato de sodio al 5%. • No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106; INAP: (01) 499-7831**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:** Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión. **MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:** Peligroso para organismos acuáticos. • No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. • No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. • Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros. • El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

**Titular del registro:**  
**INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.**  
Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.  
Santiago de Surco, Lima – Perú.  
Teléfono: (01) 499-7831

**Formulado por: POINT AGRO-CHINA LTD**  
Rm 1206, Kaisa Plaza, 1091 East Benmin Road  
Jiangyin, Jiangsu, China

**Importado y distribuido por:**  
**PERÚ PRODUCTOS AGRÍCOLAS S.A.C.**  
Av. Nicolás Arriola N° 2374, San Luis  
Teléfono: (01) 547-0688

**Contenido Neto: 40 Kg**

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



• Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. • En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin. **INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:** TRIUNFADOR 20 SP es un insecticida que presenta como ingrediente activo al acetamiprid que pertenece al grupo de los neonicotinoideos. Presenta una acción sistémica, de contacto y translaminar. Es absorbido rápidamente por el follaje y su penetración asegura una rápida residualidad. TRIUNFADOR 20 SP afecta el sistema nervioso de los insectos causándoles la muerte; además tiene un efecto sobre huevos, ninfas y adultos de insectos. Las aplicaciones de TRIUNFADOR 20 SP se realizan en campo abierto y en condiciones de invernadero requiriendo para ello la utilización de equipos de protección. Diluir la dosis recomendada en agua limpia. El volumen de agua depende de cada cultivo y el momento fenológico: en algodón y tomate el valor referencial es 400 L/ha, en palto y vid es 1000 L/ha, en mandarina es 1000-1500 L/ha. El pH del agua se recomienda entre 6 y 7. **FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Realizar máximo 1 aplicación/campaña/año de TRIUNFADOR 20 SP en tomate, algodón, palto y vid. Aplicar en el desarrollo vegetativo del cultivo y dependiendo del grado de infestación de la plaga. **PERÍODO DE REINGRESO:** Se puede ingresar al campo sin equipo de protección 48 horas después de aplicado el producto. **COMPATIBILIDAD:** TRIUNFADOR 20 SP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina. **FITOTOXICIDAD:** La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos. **RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/200 L	g/ha		
Algodón	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	200 - 250	400 - 500	14	0.5
Tomate	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	100 - 150	-	7	0.2
Palto	Queresa	<i>Fiorinia florinae</i>	100	500	47	0.01
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i>	150	750	3	0.5
Mandarina	Queresa coma	<i>Lepidosaphes beckii</i>	100-200	-	7	1

PC: Período de carencia en días. LMR: Límite máximo de residuos expresados en ppm

17 cm

15 cm

# TRIUNFADOR<sup>®</sup> 20SP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

## COMPOSICIÓN:

Acetamiprid ..... 200 g/Kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1Kg

Reg. PQUA N° 2516 - SENASA

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:** • Tóxico y altamente peligroso por inhalación, evitar respirar el polvo de la aspersión. • Altamente irritante al tracto y vías respiratorias. • Tóxico por ingestión. • Ligeramente irritante a la piel y a los ojos. • No reutilizar los envases vacíos para almacenar alimentos ni bebidas. • Almacenar el producto en ambiente fresco y ventilado, fuera de ambientes habitados por personas o animales. • No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. • Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. • Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. • Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación. • Ingresar al área tratada después de 48 horas de utilizado el producto. • No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. • Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. • Utilizar mascarilla de protección durante la mezcla y aplicación del producto. **INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:** • Grupo químico: Neonicotinoide. • En caso de intoxicación oral o inhalatoria lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrelle la etiqueta. • En caso de ingestión accidental conviene vaciar el estómago induciendo al vómito, eliminar artificialmente la parte ingerida realizando el aspirado y lavado gástrico con una solución de bicarbonato de sodio al 5%. • No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106; INAP: (01) 499-7831

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:** Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión. **MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:** Peligroso para organismos acuáticos. • No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. • No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. • Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros. • El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.



Titular del registro:  
**INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.**  
Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.  
Santiago de Surco, Lima – Perú.  
Teléfono: (01) 499-7831

Formulado por: **POINT AGRO-CHINA LTD**  
Rm 1206, Kaisa Plaza, 1091 East Benmin Road  
Jiangyin, Jiangsu, China

Importado y distribuido por:  
**PERÚ PRODUCTOS AGRÍCOLAS S.A.C.**  
Av. Nicolás Arriola N° 2374, San Luis  
Teléfono: (01) 517-0638

Contenido Neto: 50 Kg

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO



• Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. • En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin. **INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:** TRIUNFADOR 20 SP es un insecticida que presenta como ingrediente activo al acetamiprid que pertenece al grupo de los neonicotinoideos. Presenta una acción sistémica, de contacto y translamhar. Es absorbido rápidamente por el follaje y su penetración asegura una rápida residualidad. TRIUNFADOR 20 SP afecta el sistema nervioso de los insectos causándoles la muerte; además tiene un efecto sobre huevos, ninfas y adultos de insectos. Las aplicaciones de TRIUNFADOR 20 SP se realizan en campo abierto y en condiciones de invernadero requiriendo para ello la utilización de equipos de protección. Diluir la dosis recomendada en agua limpia. El volumen de agua depende de cada cultivo y el momento fenológico: en algodón y tomate el valor referencial es 400 L/ha, en palto y vid es 1000 L/ha, en mandarina es 1000-1500 L/ha. El pH del agua se recomienda entre 6 y 7. **FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Realizar máximo 4 aplicaciones/campaña/año de TRIUNFADOR 20 SP en tomate, algodón, palto y vid. Aplicar en el desarrollo vegetativo del cultivo y dependiendo del grado de infestación de la plaga. **PERÍODO DE REINGRESO:** Se puede ingresar al campo sin equipo de protección 48 horas después de aplicado el producto. **COMPATIBILIDAD:** TRIUNFADOR 20 SP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina. **FITOTOXICIDAD:** La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos. **RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/200 L	g/ha		
Algodón	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	200 - 250	400 - 500	14	0.5
Tomate	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	100 - 150	-	7	0.2
Palto	Queresa	<i>Fiorinia fioriniae</i>	100	500	47	0.01
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i>	150	750	3	0.5
Mandarina	Queresa coma	<i>Lepidosaphes beckii</i>	100-200	-	7	1

PC: Período de carencia en días. LMR: Límite máximo de residuos expresados en ppm

17 cm

26.5 cm

9.9 cm

# TRIUNFADOR<sup>®</sup> 20SP

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**


**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO SOLUBLE (WP)**

**COMPOSICIÓN:**  
 Acetamiprid .....200 g/kg  
 Aditivos.....c.s.p. 1kg

Reg. PQUA N° 2516-SENASA

Grupo Químico: Neonicotinoides  
 Nombre Químico: (E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine  
 Fórmula Empírica: C<sub>10</sub>H<sub>11</sub>ClN<sub>4</sub>  
 Peso Molecular: 300.35 g/mol  
 Fórmula Estructural:



NO CORROSIVO    NO INFLAMABLE    NO EXPLOSIVO

26.5 cm

**PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**  
 Estado físico: Polvo  
 Color: Blanquecino  
 Olor: Sin olor  
 pH: 8 - 9  
 Densidad: 0.27 - 0.30 g/ml a 20 ° C.  
 Inflamabilidad: No es inflamable.  
 Explosivo: No es explosivo

**PRESENTACIONES COMERCIALES:**  
 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 25 kg, 40 kg, 50 kg.

**Titular del registro:**  
**INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.**  
 Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.  
 Santiago de Surco, Lima - Perú.  
 Teléfono: (01) 499-7831

**Formulado por:** POINT AGRO-CHINA LTD  
 Rm 1206, Kaisa Plaza, 1091 East Renmin Road  
 Jiangyin, Jiangsu, China

**Importado y distribuido por:**  
**PERÚ PRODUCTOS AGRÍCOLAS S.A.C.**  
 Av. Nicolás Arriola N° 2374, San Luis  
 Teléfono: (01) 647-0638

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Neonicotinoide
- En caso de intoxicación oral o inhalatoria lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión accidental conviene vaciar el estómago induciendo al vómito, eliminar artificialmente la parte ingerida realizando el aspirado y lavado gástrico con una solución de bicarbonato de sodio al 5%.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU 106, INAP: (01) 499-7831**

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**  
 Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



26.5 cm

9.9 cm

**"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Tóxico y altamente peligroso por inhalación, evitar respirar el polvo de la aspersión
- Altamente irritante al tracto y vías respiratorias.
- Tóxico por ingestión.
- Ligeramente irritante a la piel y a los ojos.
- No reutilizar los envases vacíos para almacenar alimentos ni bebidas.
- Almacenar el producto en ambiente fresco y ventilado, fuera de ambientes habitados por personas o animales.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación
- Ingresar al área tratada después de 48 horas de utilizado el producto.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilizar mascarilla de protección durante la mezcla y aplicación del producto.

26.5 cm

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**  
**TRIUNFADOR 20 SP** es un insecticida que presenta como ingrediente activo al acetamiprid que pertenece al grupo de los neonicotinoides. Presenta una acción sistémica, de contacto y translinar. Es absorbido rápidamente por el follaje y su penetración asegura una rápida residualidad. **TRIUNFADOR 20 SP** afecta el sistema nervioso de los insectos causándoles la muerte; además tiene un efecto sobre huevos, ninfas y adultos de insectos. Las aplicaciones de **TRIUNFADOR 20 SP** se realizan en campo abierto y en condiciones de invernadero requiriendo para ello la utilización de equipos de protección. Diluir la dosis recomendada en agua limpia. El volumen de agua depende de cada cultivo y el momento fenológico: en algodón y tomate el valor referencial es 400 L/ha, en palto y vid es 1000 L/ha, en mandarina es 1000-1500 L/ha. El pH del agua se recomienda entre 6 y 7.

**CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ROPA DE PROTECCIÓN:**  
 Para preparar la mezcla, utilizar guantes y botas de goma, delantal, tapabocas y careta de protección. Durante la aplicación, utilizar guantes y botas de goma, overol, máscara o respirador, gafas y gorro.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**  
 Realizar máximo 1 aplicación/campaña/año de **TRIUNFADOR 20 SP** en tomate, algodón, palto y vid. Aplicar en el desarrollo vegetativo del cultivo y dependiendo del grado de infestación de la plaga.

**PERIODO DE REINGRESO**  
 Se puede ingresar al campo sin equipo de protección 48 horas después de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**  
**TRIUNFADOR 20 SP** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD**  
 La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**EFFECTO SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS Y/O SUSCEPTIBLES**  
 No se han reportado efectos sobre otros cultivos ni susceptibilidad.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**  
 El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/200 L	g/ha		
Algodón	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	200 - 250	400 - 500	14	0.5
Tomate	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	100 - 150	-	7	0.2
Palto	Queresa	<i>Fiorinia florinae</i>	100	500	47	0.01
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i>	150	750	3	0.5
Mandarina	Queresa coma	<i>Lepidosaphes beckii</i>	100 - 200	-	7	1

PC: Período de carencia en días      LMR: Límite máximo de residuos (partes por millón)

