


26 x 13.9 cms



"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGASE BAJO LLAVE,
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua u jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe usarse para conservar alimentos o agua de consumo.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Ac. Benzoico y Sulfonilurea.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Teléfonos de emergencias:
CICOTOX: 0800- 13040
ESSALUD: 0801-10200
CISPROQUIM: 0800-50-847
Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú: 434-5600

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enrollar las bolsas vacías empezando por la parte abierta, destruya el envase y deposítelo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques, arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia agua subterráneas.

PEAK TURBO® 55 WG

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRICOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES- WG

Composición

Dicamba	500 g/Kg
Prosulfuron	50 g/Kg
Aditivos	c.s.p. 1 kg

PQA N°. -SENASA

Titular del Registro:

Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal del Perú
Manuel Olguín 335 Of. 808, Urb. Los Granados
Santiago de Surco, Lima - Perú
Teléfono: 434-5600

Formulado por:

Syngenta Crop Protection Múchwilen AG
Suiza

Importado y Distribuido por:

syngenta®

Contenido Neto: 1 kg

Lote N°.:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

Los nombres de producto que contengan ® o ™,
El logo SYNGENTA y el marco CP FRAME,
Son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta

syngenta®

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **PEAK TURBO® 55 WG** es un herbicida en gránulos dispersables en agua que actúa sobre las malezas de hoja ancha en post-emergencia (2-4 hojas), indicadas en el cuadro de usos.
- Agitar bien el envase antes de utilizar el producto.
- Para la preparación, verter la cantidad de **PEAK TURBO® 55 WG** a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua. En caso utilice un surfactante no iónico, añádale de último y vuelva a agitar.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS (kg/ha)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO			
Maíz	Yuyo Capulí cimarrón Verdolaga Amor seco Hierba mora Lechera	<i>Amaranthus spinosus</i> <i>Nicandra physalodes</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Solanum nigrum</i> <i>Euphorbia heterophylla</i>	0.3-0.4	60	0.01*

P.C. Periodo de Carencia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm)

* Dicamba y Prosulfuron

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

- Para obtener un control óptimo y económico, **PEAK TURBO® 55 WG** debe ser aplicado en post-emergencia de las malezas, cuando estas tengan entre 2-4 hojas.
- Realizar como máximo una aplicación por campaña (dos campañas al año).

PERIODO DE REINGRESO

- No reingresar al área tratada sin equipo de protección antes de las 12 horas, después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD

- Es conveniente antes de realizar cualquier mezcla efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

- Siempre que **PEAK TURBO® 55 WG** se aplique de acuerdo a las indicaciones que se dan, no se han reportado problemas de fitotoxicidad a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

PT 07 19



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

