

14.5 ± 0.3 cm

2.2 cm

1.0 ± 0.3

48.0 ± 0.3 cm

1.0 ± 0.3

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es DAÑINO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo Químico: Phosphonoglycine.**
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:  
CICOTOX: 0800-1-3040  
ESSALUD: 411 8000 (opción 4)  
CISPROQUIM: 0800-50847

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- El aplicador debe emplear todas la medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



# FUEGO®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN:

Glyphosate..... 480 g/L  
(360 g de ácido glifosato)  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

PQUA N° XXXX - SENASA

Titular del Registro, Importado y distribuido por:  
NEOAGRUM S.A.C.

**neogram**

Pj. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla.  
Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400

Contenido neto: 200 L

N° de Lote:

F. de Form.:

F. de Venc.:

Formulado por:

IPROCHEM COMPANY LIMITED

35th Floor, Guomao Business Mansion, 3005 Nanhu

Rd., Luohu District, Shenzhen - CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

FUEGO® es un herbicida sistémico post emergente, no selectivo que controla malezas anuales, bianuales y perennes, monocotiledóneas y dicotiledóneas, así como las ciperáceas. No tiene efecto residual en el suelo debido a que es inactivado por las partículas del suelo. Se recomienda aplicar cuando las malezas se encuentran en crecimiento. Se puede aplicar en los campos de cultivo en forma dirigida a las malezas. FUEGO® al ser usado en el control de malezas en huertos frutales debe aplicarse en forma dirigida teniendo cuidado que el producto no llegue a tocar el follaje de los árboles. No mezclar, almacenar o aplicar FUEGO® en recipiente de acero, hierro o fierro galvanizado ya que pueden formar gases combustibles.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO                             | PLAGA                                                                              |                                                                                                                                                                        | DOSIS<br>L / 200 L | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|
|                                     | Nombre Común                                                                       | Nombre Científico                                                                                                                                                      |                    |                |                 |
| Alcachofa                           | Gramma china<br>Pata de gallina<br>Cadillo                                         | <i>Sorghum halepense</i><br><i>Eleusine indica</i><br><i>Cenchrus echinatus</i>                                                                                        | 3.0 - 4.0          | 14             | 0.1             |
| Canales de riego, acequias y bordes | Kikuyo<br>Cola de zorro<br>Higuera                                                 | <i>Pennisetum clandestinum</i><br><i>Leptochloa filiformis</i><br><i>Ricinus communis</i>                                                                              | 2.0                | --             | --              |
| Espárrago                           | Coquito<br>Gramma china<br>Cadillo<br>Higuera                                      | <i>Cyperus rotundus</i><br><i>Sorghum halepense</i><br><i>Cenchrus echinatus</i><br><i>Ricinus communis</i>                                                            | 2.5                | 30             | 0.1             |
| Vid*<br>Mandarina**                 | Coquito<br>Gramma dulce<br>Pata de gallina<br>Gramalote<br>Gramma china<br>Cadillo | <i>Cyperus rotundus</i><br><i>Cynodon dactylon</i><br><i>Eleusine indica</i><br><i>Urochloa mutica</i><br><i>Sorghum halepense</i><br><i>Cenchrus echinatus</i>        | 1.5 - 3.0          | *14<br>** 7    | *0.5<br>**0.5   |
| Mango                               | Amor seco<br>Verdolaga<br>Yuyo<br>Coquito<br>Gramma china<br>Hierba del gallinazo  | <i>Bidens pilosa</i><br><i>Portulaca oleracea</i><br><i>Amaranthus dubius</i><br><i>Cyperus rotundus</i><br><i>Sorghum halepense</i><br><i>Chenopodium murale</i>      | 2.0 - 3.0          | 14             | 0.2             |
| Pimiento                            | Coquito<br>Gramma dulce<br>Verdolaga<br>Yuyo<br>Pata de gallina<br>Pega pega       | <i>Cyperus rotundus</i><br><i>Cynodon dactylon</i><br><i>Portulaca oleracea</i><br><i>Amaranthus caudatus</i><br><i>Eleusine indica</i><br><i>Setaria verticillata</i> | 3.0 - 4.0          | 14             | 0.1             |
| Palto                               | Hierba de gallina<br>Capuli cimarron<br>Verdolaga<br>Pega pega                     | <i>Chenopodium murale</i><br><i>Nicanra physalodes</i><br><i>Portulaca oleracea</i><br><i>Setaria verticillata</i>                                                     | 2.0                | 7              | 0.1             |

Caña de azúcar: Uso como madurante. Realizar la aplicación después del agosto. Dosis: 1.3 - 1.6 L/ha

PC: Periodo de Carenacia

LMR: Limite Máximo de Residuo

nd: No determinado

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Se recomienda aplicar FUEGO® una sola aplicación por campaña máximo, considerando una campaña por año. Dirija el caldo herbicida hacia las malezas con crecimiento activo y sin daño físico o mecánico.

**PERIODO DE REINGRESO:** Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

**COMPATIBILIDAD:** FUEGO® es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas y polvos mojables al igual que con 2,4-D. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:** FUEGO® no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

