

ADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

ACIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

oducto es de cuidado, no ingerir.
var el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
anar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
nacerar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni

ner, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada
limeras 24 horas después de la aplicación.
iás de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con
nte agua y jabón.
in envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar
s o agua para consumo.
la aplicación siguiendo la dirección del viento.

OS AUXILIOS

Químico: Triazoles
o de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico
rele la etiqueta.
o de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona
nsciente o padece convulsiones.
o de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15
, cuidando que los párpados estén levantados.
o de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con
nte agua y jabón.
o de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un
te ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático.
s de Emergencia: • CICOTOX: 0800-1-3040
• ESSALUD: 0801-1-0200

O Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

és de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los
stinados por las autoridades locales para este fin"
lva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado".
ar obligatoriamente el triple lavado del presente envase".



AS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

so para organismos acuáticos".
ntaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos".
ntaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del
o".
tar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros".
so para los animales domésticos, fauna y flora silvestre". "No permitir animales
a tratada".
cador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva".
ducto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos
te permeables".
o de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en
seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas".

VIRTUD 250 EC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Difenoconazole..... 250 g/L.
Aditivos..... c.s.p. 1 L.

Reg. PQUA N° 2528-SENASA

TITULAR DE REGISTRO:

JESEN & JESSEN PERÚ S.A.C

RUC: 20600385179
Av. de la Floresta 497, Oficina 201.
Chacarilla del Estanque, San Borja,
Lima 41, Lima - Perú

FORMULADO POR:

NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO., LTD.

9th Floor, No.58, Nanhu Road, Nanjing 210017 - China.
Tel: 86 25 86518999 ext. 836
Fax: +86 25 86455985

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Solandina Perú SAC.

Tel: +51960241693
Av. Alfredo Benavides N° 2975 - Of. 902
Urb. A. Von Humboldt - MIRAFLORES
LIMA - PERU



Fecha de formulación:

N° de lote:

Contenido neto: 500 mL.

Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

VIRTUD 250 EC, cuyo ingrediente activo es Difenoconazole, Fungicida sistémico con acción preventiva y curativa. Absorbido por las hojas con translocación transaminar acropetal y fuerte. Inhibidor de la desmetilación del esterol. Inhibe la biosíntesis de ergosterol en la membrana celular, deteniendo el desarrollo del hongo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Nombre de Enfermedad		Dosis (L/200L)	RC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Esparrago	Mancha foliar	Stemphylium versicarium	0.15 - 0.20	7	0.03
Tomate	Tizón temprano	Alternaria solani	0.15	7	2
Arroz	Pyricularia	Pyricularia oryzae	0.2 L/Ha	28	3

LMR = Límite Máximo de Residuos | PC = Período de Carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda máximo dos (2) aplicaciones por campaña considerando dos (2) campañas al año; cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad en el cultivo con una frecuencia de 15 días entre aplicación.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD

En mezcla de tanque es miscible con formulaciones de las mismas características. Se recomienda elaborar una pre-mezcla en pequeña escala para estudiar compatibilidad con otros productos.

FITOTOXICIDAD

No se evidenciaron problemas de fitotoxicidad si se aplica de acuerdo con las especificaciones recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas."



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

