

31,2 ± 0,3

“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”


“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Nombre del producto: DOMADOR® 500 WG
Nombre común: Azoxystrobin
Nombre IUPAC: methyl (E)-2-{2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl}-3-methoxyacrylate

Reg. PQUA N° 2530 - SENASA

Composición:
Azoxystrobin 500 g/kg
Aditivos..... c.s.p. 1 kg

Fórmula empírica:
C₂₂H₁₇N₅O₅
Peso molecular:
403,4 g mol⁻¹
Fórmula estructural:



PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL PRODUCTO FORMULADO
• Apariencia: Gránulos
• Color: Blanco a blanco opaco
• Olor: Ligero
• Almacenamiento: DOMADOR® 500 WG conserva sus características físicas y de composición bajo condiciones de almacenamiento a temperatura ambiente y en su envase original y sellado.

NO INFLAMABLE
NO CORROSIVO
NO EXPLOSIVO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
• El producto es irritante ocular. Evite el contacto con los ojos.
• Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
• Después de usar este producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
• No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
• No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, forraje y/o semillas.
• Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
• Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
• Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
• Grupo Químico: Estrobilurina.
• En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
• En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona de aire fresco. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
• En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 10 minutos.
• En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
• No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
• Nota al médico: tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
SICSAC: (01) 644-9297

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
• Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
• Peligroso para organismos acuáticos.
• No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
• No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos de envases vacíos.
• Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
• Es ligeramente peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
• El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
• Evitar el uso de producto en zonas con napas freáticas superficiales y subterráneas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
DOMADOR® 500 WG es un fungicida sistémico y traslaminar, con acción protectora y curativa, que actúa bloqueando la respiración mitocondrial, inhibiendo la germinación de esporas y el crecimiento del hongo.

MÉTODO DE PREPARACIÓN
DOMADOR® 500 WG, se prepara diluyendo la dosis indicada y luego vaciar la mezcla en el recipiente final y completar con agua hasta el volumen requerido. Usar agua en cantidad que permita cobertura del follaje y en cultivos en capacidad de campo.

MÉTODO DE APLICACIÓN
DOMADOR® 500 WG puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, por parihuelas, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y correctamente calibrado.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/ha	g/200L		
ARÁNDANO	Cabeza de clavo	Alternaria tenuissima	0,3-0,35	-	14	5
ESPÁRRAGO	Mancha foliar	Stemphylium vesicarium	0,2	100	7	0,01
VID	Oidiosis	Erysiphe necator	0,2	-	14	2

P.C.: Periodo de Carencia L.M.R.: Limite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Aplicar previa evaluación de la plaga o cuando se presenten condiciones favorables para el desarrollo de la plaga. Aplicar 2 veces por campaña a intervalos de 7 a 14 días en espárrago. Para vid considerar 1 aplicación por campaña/año con un gasto de agua de 1000 L/ha, para arándano considerar 1 aplicación por campaña/año con un gasto de agua de 600 L/ha y pH de 5-6 para ambos.

PERIODO DE REINGRESO
Puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD
DOMADOR® 500 WG es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común. No mezclar con aceites agrícolas ni clorpirifos.

FITOTOXICIDAD
No se han observado síntomas de fitotoxicidad, debido a las bajas concentraciones empleadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)



Titular del Registro:
SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY S.A.C.
Av. Nicolás de Ayllón N°2941 dpto.7A Z.I.
El Agustino. Lima - Perú.
Telf.: (01) 644-9297

Formulado por:
JIXI AGROSINO BIOTECH CO. LTD.
No. 7 Huanyang East Road, Jixi County
Anhui Province. China.

Importado y Distribuido por:
SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY S.A.C.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

13,0 ± 0,3

2,0