

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**FORCE 800 WG** es un insecticida de acción sistémica y de amplio espectro; que actúa por contacto e ingestión. Presenta un buen efecto residual.

Se emplea diluido en agua; preparar una pre - mezcla de acuerdo a la dosis recomendada, en un tercio del volumen de agua a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua de aplicación.

**FORCE 800 WG** puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, parihuelas, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y correctamente calibrado.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

| CULTIVO   | PLAGA                     |                               | DOSIS<br>kg/Ha | P.C.<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|---------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|
|           | Nombre Común              | Nombre Científico             |                |                |              |
| ESPARRAGO | "Mosquilla de los brotes" | <i>Prodioplosis longifila</i> | 0.16           | 21             | 0.005        |

LMR: Límite Máximo de Residuos (partes por millón - ppm).

P.C.: Periodo de Carenacia

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomienda aplicar **FORCE 800 WG** hasta dos aplicaciones por campaña, considerando una frecuencia entre aplicaciones de 14 días.

Se deberá evaluar la incidencia de la plaga y las condiciones optimas de su desarrollo, para proceder a la aplicación de **FORCE 800 WG** dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo.

**PERIODO DE REINGRESO:**

No entre a las áreas tratadas hasta después de 12 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

**FORCE 800 WG** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común; sin embargo, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con los productos a utilizar.

**FITOTOXICIDAD:**

**FORCE 800 WG** no es fitotóxico usado a las dosis, sistema de aplicación y cultivos recomendados en esta etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

**INSECTICIDA AGRICOLA****Gránulos Dispersables (WG)****COMPOSICIÓN:**

Fipronil.....800 g/kg  
Aditivos.....c.s.p 1kg

**Registro PQUA N° 2453 SENASA****Titular de Registro, Importador y Distribuidor:****AGREVO PERUANA S.A.C.**

Jr. San Sebastián N° 298.

Urb. El Sol de la Molina II Etapa

La Molina, Lima - Perú.

Teléfono: (01) 632-8482


**Formulador:****FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD**29 F, Soho Mansion, N° 8 South Zhongshan Road,  
Nanjing - China**Lote N°.****F. de Form.****F. de Venc.****NO CORROSIVO****NO INFLAMABLE****NO EXPLOSIVO****MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**  
**“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**Nombre comercial del producto:****FORCE 800 WG****Nombre común: Fipronil****Clase: Insecticida Agrícola****Reg PQUA N°: 2453 - SENASA****COMPOSICIÓN:**

Fipronil .....800 g/kg

Aditivos .....csp. 1kg

**Formula empírica:** C<sub>12</sub>H<sub>4</sub>Cl<sub>2</sub>F<sub>6</sub>N<sub>4</sub>O<sub>2</sub>**Peso Molecular:** 437.15 g/mol**Formula estructural:****Presentación del producto:**Envases de **500 g y 1 kg****Propiedades Físicas y químicas del producto  
formulado**

Apariencia: Sólido

Color: Blanco

Olor: Olor a moho

Densidad: 1.476 - 1.626 g/ml, a 20°C

pH: 5.0 - 8.0

Corrosividad: No corrosivo.

Estabilidad en el almacenamiento: conserva sus propiedades biológicas, químicas y físicas como mínimo dos años cuando es conservado en un lugar, frío, seco y bien ventilado, lejos de la luz solar directa.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es DAÑINO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (aspersión).
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajeros.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS****Grupo químico: Phenylpyrazole**

No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.

En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.

En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.

En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

CICOTOX: 0-800-1304

ESSALUD: 0-801-1020

AGREVO ANDINA S.A.C.: 01-632-8482

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- "Peligroso para las abejas".
- "No aplicar en época de floración del cultivo".
- "No aplicar en presencia de polinizadores".
- "No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños".
- "Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes" "Evitar la deriva por el viento".
- "Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas".
- "Peligroso para organismos acuáticos".
- "No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos".
- "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto".
- "Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros".
- "Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre" "No permitir animales en el área tratada".
- "El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva".
- "El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables".
- "En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas".

