

PARACHUPADERA
740 PM

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Evite el contacto directo.
- No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en lugares secos y ventilados, lejos del calor.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Carboxamidas + Talamidas.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela esta etiqueta. Su ingestión accidental produce síntomas de intoxicación como diarrea, náuseas, vómitos, debilidad muscular, hipotermia, anorexia.
- En caso de ingestión: no administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Si el paciente está consciente, lavar la boca con agua. Inducir al vómito bajo asistencia de un médico.
- En caso de inhalación: llevar al intoxicado o persona afectada a un lugar ventilado, si es necesario aplicar respiración artificial. Solicitar atención médica.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos.
- Si el contacto fuese con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón. Si persiste la irritación acudir a un centro de asistencia médica.
- ANTIDOTO:** No existe antidoto específico. El tratamiento será sintomático.
- Teléfono de emergencia: CICOTOX: 0-800-13040 Atención 24 horas. ESSALUD: 411-8000 Op. 4, AGRO KLINGE S.A.: (01) 612-6565**

PARACHUPADERA
740 PM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Flutolanil 100 g/Kg
Captan 640 g/Kg
Aditivos csp 1 Kg

Reg. PQUA N° 2122-SENASA

Formulador: **TQC** Tecnología Química y Comercio S.A.
Calle René Descartes N° 311
Urb. Santa Raquel 2° Etapa, Ate. Lima - Perú.
Tel.: 612-6565, Fax: 348-1020
RUC N° 20307150981

Titular del Registro y Distribuidor: **AgroKlinge** AGRO KLINGE S.A.
Calle René Descartes N° 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima-Perú.
Tel.: 612-6565
R.U.C. N° 20508704217

Contenido
Neto: 200 g

Lote N°:
F. de Formulación:
F. de Vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DANIÑO



"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los organismos acuáticos; no contaminar lagos, ríos estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Producto Peruano



"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: PARACHUPADERA 740 PM es un fungicida para el tratamiento de semillas, que combina la acción sistémica-curativa del Flutolanil, y la acción preventiva, de largo poder residual y amplio espectro del Captan. Esta combinación es altamente efectiva para el control del complejo de hongos fitopatógenos tales como *Rhizoctonia*, *Fusarium* y *Sclerotium* que causan la "chupadera fungosa" en plantas recién emergidas.

FORMA DE APLICACIÓN: Humedecer ligeramente las semillas a tratar, luego espolvorear PARACHUPADERA 740 PM sobre listas, removiéndolas energícamente para lograr una cobertura uniforme. También se emplea en aspersiones, previa mezcla con agua, dirigidas al cuello de las plántulas. Su color característico sirve como indicador de una correcta distribución del producto sobre la semilla; además, permite al usuario alertar de ingestiones accidentales.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Enfermedad		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm) Fusarium/Captan**
	Nombre Común	Nombre Científico	g/kg de semilla	g/cantidad de semilla		
Algodón	"Chupadera fungosa"	<i>Rhizoctonia solani</i>	3-4	200 g/100 de semilla	N.A.	0,05* / 0,02**
Frijol (*)	"Chupadera fungosa" "Podredumbre radicular "antrax"	<i>Rhizoctonia solani</i> <i>Fusarium</i> <i>Aspergillus</i>	3-4	200 g/50 kg de semilla	N.A.	0,05* / 0,02**
Papa	"Chupadera fungosa"	<i>Rhizoctonia solani</i>	---	300 g/1TM de semilla/100 litros de agua	N.A.	0,5* / 0,05**
Tomate	"Chupadera fungosa"	<i>Rhizoctonia solani</i>	3-4	---	N.A.	0,05* / 5**
Maíz	"Podredumbre radicular"	<i>Fusarium sp.</i>	3-4	200 g / 50 kg de semilla	N.A.	0,05* / 0,02**

APLICACIONES DIRIGIDAS AL CUELLO DE LAS PLÁNTULAS:

Cultivo	Enfermedad		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm) Fusarium/Captan**
	Nombre Común	Nombre Científico	%	g/moch. 20 L.		
Frijol	"Podredumbre blanca o del tallo"	<i>Sclerotium rolfsii</i>	0,2	40	7	0,05* / 0,02**

P.C. = Período de carencia / N.A. No aplica, debido a que el producto se utiliza a la siembra / L.M.R. = Límite máximo de residuos.
VOLUMEN DE APLICACIÓN: 400L/ha
FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Realizar una sola aplicación por campaña cuando se observen los primeros síntomas o las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.
VOLUMEN DE APLICACIÓN: 400 L/ha. **PERIODO DE REINGRESO:** 24 horas después de la aplicación.
COMPATIBILIDAD: Incompatible con los plaguicidas de reacción alcalina. **FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico en los cultivos indicados y dosis recomendadas. **RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.
© Marca Registrada