

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación, y para ingresar el área tratada en las primeras 24 horas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Fosfonoglicina
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o podría convulsionar.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados; y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático. Antídoto: No tiene antídoto específico.
- Teléfonos de Emergencia:
CICOTOX: 0800-13040 ó 328-7398 (gratuito) / ESSALUD: 117 (gratuito)
CISPROQUIM: 0801-050-847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para organismos acuáticos y semiacuáticos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. Mantenga a los animales fuera de las zonas tratadas al menos durante 7 días después de la aplicación.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas altas.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

FITOFIRE® 48% SL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRICOLA

Concentrado Soluble – SL

Composición química:

Glyphosate.....480 g/L
Aditivos.....c.s.p 1 L

Registro PQUA N° xxxx- SENASA

Titular del Registro: IPEH

Formulado por:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD
6th Floor, Gaoxinjishuchuangye Centre, Shunhua Road 750
Jinan, Shandong, China
+86-531-88875230

Importado y distribuido por:

INSTITUTO PERUANO DEL ESPARRAGO Y HORTALIZAS
Calle 21 N° 713 Oficina 205 San Isidro Lima - Perú
Teléfono: (01) 225-5951
www.ipeh.org.pe

F. de Form:

N° Lote:

Contenido Neto: 20 L

F. de Venc:



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

© Marca registrada por IPEH

INDICACIONES DE USO

FITOFIRE 48% SL es un herbicida sistémico postemergente. Es absorbido por las hojas y se trasloca dentro de una planta hasta la raíz y partes vegetativas subterráneas acosionando la muerte total de las plantas emergidas. No tiene efecto residual en el suelo.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

FITOFIRE 48% SL se emplea diluido en agua, en un volumen que permita una buena penetración del producto. Preparar una pre-mezcla en un balde de acuerdo a la dosis indicada. Luego, vaciar al recipiente definitivo completando la cantidad con agua.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS Y DOSIS

Cultivo	Plaga		Dosis	P.C. (Días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/ha		
Espárrago	Coquito	<i>Cyperus rotundus</i>	3-5	14	0.5

PC: Período de carencia / **LMR:** Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Efectuar un máximo de 1 aplicación por campaña por año. Aplicar en postemergencia en cualquier etapa de desarrollo del cultivo, siempre que las malezas tengan área foliar para la captación del producto. Evitar el contacto con el cultivo, la aplicación debe ser dirigida a la maleza.

PERIODO DE REINGRESO

24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y manejo de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

